



ALECENSA® Alectinib

PATIENT



PRESCRIPTION ET DÉLIVRANCE

Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre **médecin hospitalier cancérologue**.

Il est disponible **dans les pharmacies de ville**.

Lorsque vous quittez votre domicile, pensez à prendre vos ordonnances et faites activer votre dossier pharmaceutique. **Si votre traitement est définitivement interrompu, ne jetez pas les boîtes entamées, ni les comprimés restants dans votre poubelle, mais rapportez-les à votre médecin prescripteur.**

PRESENTATIONS ET CONSERVATION



Les gélules d'ALCENSA® sont présentées en plaquettes de 8 gélules blanches, dosées à 150 mg. Les boîtes contiennent 56 gélules (7 plaquettes) et sont conditionnées par 4 (soit 224 gélules au total).

Conservez ce médicament à **une température inférieure à 25°C**.

Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants.

MODE D'EMPLOI



La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste. La dose habituelle est **4 gélules de 150 mg (600 mg) 2 fois par jour (soit 1200 mg par jour)**.

Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.

Les gélules d'Alcensa® sont à avaler entières de préférence avec de l'eau **en deux prises par jour, une le matin et une le soir**, pendant les repas. **Essayez de respecter 12 heures entre chaque prise.**

Les gélules ne doivent pas être écrasées, ouvertes, ni dissoutes.

Le **pamplemousse** (jus, pulpe) doit être évité pendant votre traitement par Alecensa® : il augmente les toxicités.

INTERACTIONS



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes. Par exemple, il faut éviter la prise du **millepertuis** (*Hypericum perforatum*) sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, gouttes...) ou de Ganodermax® qui diminue l'efficacité du traitement.

N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre. En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

EFFETS INDESIRABLES



Constipation	⇒ Buvez régulièrement de l'eau. Pratiquez quelques exercices légers.	⇒ Buvez si possible 2 litres d'eau par jour. Privilégiez une alimentation riche en fibres : légumes verts, fruits et fruits secs. En cas de constipation prolongée par rapport à vos habitudes, contactez votre médecin.
Fatigue	⇒ Il est normal d'être fatigué au cours du traitement. Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sainement). Respectez des temps de repos dans la journée, mais essayez de conserver une activité même modérée.	⇒ Soyez à l'écoute de votre corps. Prudence en cas de conduite de véhicules. En cas de fatigue persistante inhabituelle, informez votre médecin pour contrôle de la prise de sang.
Gonflement des bras et des jambes	⇒ Elevez vos pieds quand vous êtes assis. Les vêtements serrés sont déconseillés. Maintenez une alimentation à faible teneur en sel.	⇒ Surveillez régulièrement votre poids. Si prise de poids rapide et inattendue, contactez le médecin.

Troubles hépatiques	⇒	Il est recommandé de surveiller la fonction hépatique. Préférez des repas légers Evitez les aliments frits, gras, trop sucrés, l'alcool.	⇒	Consultez le médecin pour une adaptation du traitement (arrêt et réduction de posologie) en fonction des résultats.
Modification du bilan sanguin	⇒	Un bilan sanguin doit être effectué régulièrement et les résultats communiqués à votre médecin.	⇒	En cas de signes infectieux (fièvre, toux) ou de saignements inhabituels, prévenir le médecin. Faire pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.
Douleurs musculaires	⇒	Boire régulièrement. Eviter les gestes répétitifs et les efforts physiques importants.	⇒	Traitement symptomatique par paracétamol possible

Si vous ressentez des effets non mentionnés, n'hésitez pas à en parler à votre prescripteur, généraliste et pharmacien.

QUELQUES CONSEILS



Contactez rapidement le médecin en cas de :

- Essoufflement, difficultés pour respirer, œdèmes
- Douleurs musculaires

N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.

En cas d'oubli d'une prise de moins de 6 heures, prenez la dose d'ALCENSA®.

En cas d'oubli d'une prise de plus de 6 heures, ne prenez pas la dose manquée.

La dose suivante sera prise à l'heure habituelle.

Ce document d'information n'a pas de valeur contractuelle : malgré le soin apporté à la rédaction de ces fiches, une erreur ou une coquille a pu s'y glisser et ne pourra pas être imputée aux auteurs.