



ALKERAN® Melphalan

PATIENT

PRESCRIPTION ET DÉLIVRANCE



Ce médicament est prescrit par votre **médecin hospitalier ou de ville**. Il est disponible dans les **pharmacies de ville**.

Ne jetez pas les boîtes entamées ni les comprimés dans votre poubelle. Merci de les rapporter à votre pharmacien.

Votre pharmacien peut vous aider dans la prise de votre traitement, veuillez lui rapporter vos boîtes et comprimés non utilisés lors du renouvellement suivant.

PRESENTATIONS ET CONSERVATION



Flacon de 50 comprimés roses dosés à 2mg (116,66€).

Conservez ce médicament au **réfrigérateur (entre 2 et 8°C)**. **Ne pas congeler**

Gardez-le hors de portée et de la vue des enfants.

MODE D'EMPLOI



La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin. ALKERAN® ne doit pas être pris pendant la période où vous recevez de la radiothérapie.

Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement et notamment la vérification de la NFS (prise de sang) avant le traitement.

AJOUTER LA POSOLOGIE ICI

Les comprimés d'ALKERAN® sont à avaler entier, avec un grand verre d'eau, **15 à 30 minutes avant les repas**.

Les comprimés ne doivent être ni écrasés, ni coupés ou croqués.

INTERACTIONS



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes.

N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.

En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

EFFETS INDESIRABLES



Nausées et vomissements	⇒ Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas.	⇒ Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements en respectant les doses. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants.
Aphtes	⇒ Les aliments acides, épicés et irritants ne sont pas conseillés. Utilisez plutôt une brosse à dents souple, un dentifrice doux (sans menthol) et un bain de bouche sans alcool.	⇒ En cas d'apparition de douleurs diffuses dans la bouche ou de brûlure : contactez votre médecin.
Diarrhées	⇒ En cas de diarrhées, évitez le café, les boissons glacés, les fruits et les légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.	⇒ Suivez la prescription médicale contre la diarrhée. Buvez si possible 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes cuites et les bananes. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (plus de 3 diarrhées par jour).

Saignements inhabituels	⇒	En cas de saignements buccaux, préférez une brosse à dents souple. L'utilisation des thermomètres rectaux est à éviter. Certains médicaments sont déconseillés (aspirine, ibuprofène...).	⇒	Prévenez votre médecin. En cas de saignement de nez, penchez la tête en avant en exerçant une légère pression sur vos narines.
Signes d'infection : fièvre, frissons, toux, maux de gorge, brûlures urinaires	⇒	Limitez, si possible, les contacts avec les personnes ayant une infection contagieuse. Lavez-vous souvent les mains. Désinfectez soigneusement toute plaie. Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.	⇒	En cas de fièvre supérieure à 38°C, prévenez votre médecin. et faire une prise de sang (NFS) en urgence
Eruptions cutanées, démangeaisons	⇒	Préférez un produit d'hygiène sans savon (surgras, syndet) et une crème hydratant. Évitez les expositions solaires, utilisez une protection solaire 50+	⇒	En cas de symptômes persistants, contactez un médecin.

Une perte de cheveux peut survenir, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin. Si vous ressentez des effets non mentionnés n'hésitez pas à en parler à votre prescripteur ou à votre généraliste. Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

QUELQUES CONSEILS



Contactez rapidement le médecin en cas de :

- signes infectieux (fièvre, toux, frissons ...).
- difficultés à respirer ou de modification du rythme respiratoire.
- impossibilité d'uriner, douleur intense à la vessie ou présence de sang dans les urines.
- éruption cutanée

N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.

Si vous avez oublié une prise d'ALKERAN®, ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle, le lendemain.