Unité de prise en charge des thérapies orales :
03.45.34.81.50
du lundi au vendredi, de 9h à 17h45

CAPRELSA® Vandétanib

PATIENT

PRESCRIPTION ET DÉLIVRANCE

Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre **médecin hospitalier cancérologue ou compétent en cancérologie**. Il est disponible **dans les pharmacies de ville**.
Lorsque vous quittez votre domicile, pensez à prendre vos ordonnances et faites activer votre dossier pharmaceutique.
Si votre traitement est définitivement interrompu, ne jetez pas les boîtes entamées, ni les comprimés restants dans votre poubelle, mais rapportez-les à votre médecin prescripteur.

PRESENTATIONS ET CONSERVATION

Boîtes de 30 comprimés pelliculés dosés à 100 mg (1400€) ou à 300 mg (4200€)

Conservez ce médicament à **une température inférieure à 30°C,** à l'abri de la lumière et de l'humidité. **Gardez-le hors de la portée et de la vue des enfants.**

MODE D'EMPLOI

La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste.
La dose habituelle est de 300 mg en une prise par jour.
Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.

Le comprimé de CAPRELSA® est à avaler avec un verre d'eau non gazeuse, **une fois par jour**, pendant ou en dehors du repas.
Essayez de le prendre chaque jour à la même heure.

Si vous ne pouvez pas avaler le comprimé, vous pouvez le disperser dans un grand verre d'eau non gazeuse. Remuez (environ 10 minutes), sans écraser, avec une cuillère. Buvez sans attendre.
Ajoutez un peu d'eau, remuez et buvez de façon à récupérer le maximum de médicament resté au fond du verre.
Votre pharmacien ou médecin peut vous aider.Les comprimés ne doivent être ni écrasés, ni coupés ou croqués.

INTERACTIONS

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes. Par exemple, il faut éviter la prise du **millepertuis** (*Hypericum perforatum*) sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, gouttes,…) qui diminue l'efficacité, de même que l'alcool en prise chronique.

Le **pamplemousse** (jus, pulpe) doit également être évité pendant votre traitement par CAPRELSA®.

N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.
En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

EFFETS INDESIRABLES

Diarrhée	C'est un effet qui arrive souvent : évitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.	Suivez la prescription médicale contre la diarrhée (Imodium®, Tiorfan®...). Buvez si possible 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes,…), les carottes cuites et les bananes. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (plus de 3 diarrhées par jour), en cas de fièvre et si déshydratation : une surveillance biologique du potassium est nécessaire.
Maux de tête, palpitations, bourdonnements d'oreille	Mesurez régulièrement votre tension. Limitez la consommation de sel et d'alcool.	Contactez votre médecin si ces signes surviennent. Un traitement par antihypertenseur vous sera prescrit si besoin.

CGFL CENTRE GEORGES FRANÇOIS LECLERC
Ensemble, dépassons le cancer

Nausées et vomissements	Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas.	Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements en respectant les doses. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (à partir de deux vomissements par jour).
Perte d'appétit	Prenez plusieurs petites collations par jour (aliments que vous aimez), mangez lentement, buvez beaucoup.	Privilégiez les aliments à fort pouvoir calorique : ajouter du beurre, de l'huile, de la crème fraîche, du fromage râpé, du miel…. Demandez les conseils d'une diététicienne. En cas de perte de poids, parlez-en avec votre médecin.
Eruptions cutanées, sécheresse, démangeaisons, syndrome main-pied	Préférez un savon doux et un agent hydratant. Evitez les expositions prolongées au soleil, utilisez une protection solaire écran total.	Une crème hydratante et un traitement antiprurigineux amélioreront les symptômes : contactez votre médecin traitant
Fatigue	Il est normal d'être fatigué au cours du traitement. Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sainement). Respectez des temps de repos dans la journée, mais essayez de conserver une activité même modérée.	Soyez à l'écoute de votre corps. Prudence en cas de conduite de véhicules. En cas de fatigue persistante inhabituelle, informez votre médecin
Signes d'infection : fièvre, frissons, toux, maux de gorge, brûlures urinaires	Limitez, si possible, les contacts rapprochés avec les personnes ayant une infection contagieuse. Lavez-vous souvent les mains. Désinfectez soigneusement toute plaie. Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.	En cas de fièvre supérieure à 38°C, prévenez votre médecin qui pourra vous prescrire des antibiotiques.
Gonflement des bras et des jambes	Elevez vos pieds quand vous êtes assis. Les vêtements serrés sont déconseillés. Maintenez une alimentation à faible teneur en sel.	Surveillez régulièrement votre poids. Si prise de poids rapide et inattendue, contactez le médecin
Douleurs musculaires	Boire régulièrement. Eviter les gestes répétitifs et les efforts physiques importants.	Traitement symptomatique par paracétamol possible. La chaleur (serviette chaude) peut vous apporter un soulagement local
Inflammation de la bouche	Les aliments acides, épicés ou irritants ne sont pas conseillés. Utilisez plutôt une brosse à dents souple, un dentifrice doux (sans menthol) et un bain de bouche sans alcool.	En cas d'apparition de douleurs diffuses dans la bouche ou de brûlure : contactez votre médecin.
Atteintes oculaires (vision floue, modification de la cornée…)		En cas de baisse de la vue, brutale ou progressive, appeler rapidement le médecin.

Il est possible de constater un retard de la cicatrisation. Prévenez votre médecin en cas de chirurgie ou d'extraction dentaire.
Si vous ressentez des effets non mentionnés, n'hésitez pas à en parler à votre prescripteur, généraliste ou pharmacien.
Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

QUELQUES CONSEILS

Contactez rapidement le médecin en cas de :
- Toux ou de difficulté à respirer, essoufflement, douleur thoracique.
- Modification de la vision, changement de la cornée, confusion, vertiges, maux de tête, troubles de la concentration
- Difficultés à uriner, douleur intense à la vessie ou présence de sang dans les urines
- Signes infectieux (fièvre, toux, frissons….)

Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.

Si vous avez oublié de prendre vos comprimés de CALPRESA® depuis plus de 12 heures, ne prenez pas la dose manquée.
Si vous avez oublié de prendre votre comprimé depuis moins de 12h, prenez-le et la dose suivante sera prise à l'heure normale, le lendemain

Evitez l'**exposition prolongée au soleil** et **protégez-vous** si vous devez le faire.

Ce document d'information n'a pas de valeur contractuelle : malgré le soin apporté à la rédaction de ces fiches, une erreur ou une coquille a pu s'y glisser et ne pourra pas être imputée aux auteurs.

CGFL
CENTRE GEORGES FRANÇOIS LECLERC
Ensemble, dépassons le cancer