



# CELLTOP<sup>®</sup> Etoposide

PATIENT

## PRESCRIPTION ET DÉLIVRANCE



Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre **médecin hospitalier spécialiste en cancérologie**. Il est disponible dans les **pharmacies de ville**.

Lorsque vous quittez votre domicile, pensez à prendre vos ordonnances et faites activer votre dossier pharmaceutique.

**Si votre traitement est définitivement interrompu, ne jetez pas les boîtes entamées, ni les comprimés restants dans votre poubelle, mais rapportez-les à votre médecin prescripteur.**

## PRESENTATIONS ET CONSERVATION



Trois présentations sont disponibles, sous plaquettes thermoformées:

- Boîte de 40 capsules dosées à 25 mg;
- Boîte de 20 capsules dosées à 50 mg.

A conserver à T<25 °C, dans l'emballage d'origine.

## MODE D'EMPLOI



La posologie est strictement personnelle. Le traitement sera adapté selon votre état et votre posologie par le médecin.

Les capsules doivent être absorbées entières à l'aide d'un verre d'eau, en **2 à 3 prises par jour**, au cours ou en dehors d'un repas.

**Elles ne doivent pas être ouvertes, mâchées ou écrasées.** Préférer le fractionnement en faibles doses (prise 2 ou 3 fois par jour si besoin).

Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des capsules (Si vous avez été en contact direct avec le contenu de la capsule, rincez-vous abondamment à l'eau et prévenez le médecin). Ne pas utiliser une capsule endommagée.

## INTERACTIONS



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes.

**N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.** En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

## EFFETS INDESIRABLES



<b>Signes d'infection : fièvre, frissons, toux, maux de gorge, brûlures urinaires</b>	⇒	Limitez, si possible, les contacts avec les personnes ayant une infection contagieuse. Lavez-vous souvent les mains. Désinfectez soigneusement toute plaie. Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.	⇒	En cas de fièvre supérieure à 38°C, prévenez votre médecin qui pourra vous prescrire des antibiotiques.
<b>Nausées et vomissements</b>	⇒	Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas.	⇒	Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements en respectant les doses. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (à partir de deux vomissements par jour).
<b>Aphtes</b>	⇒	Les aliments acides, épicés ou irritants ne sont pas conseillés. Utilisez plutôt une brosse à dents souple, un dentifrice doux (sans menthol) et un bain de bouche sans alcool.	⇒	En cas d'apparition de douleurs diffuses dans la bouche ou de brûlure : contactez votre médecin.

## QUELQUES CONSEILS

---

Contactez rapidement le médecin en cas de :

- signes infectieux (fièvre, toux, frissons ...)
- essoufflement, fatigue, pâleur, rythme cardiaque rapide
- ecchymoses ou saignements prolongés lors de blessures ou inhabituels

**N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.**

**Si vous avez oublié de prendre vos gélules de CELLTOP®, ne prenez pas la dose manquée.**

La dose suivante sera prise à l'heure normale, au moment venu.

Il est déconseillé de prendre CELLTOP® pendant la grossesse et l'allaitement. Utilisez une méthode contraceptive efficace