



CELLTOP[®] Etoposide

INDICATION AMM

CELLTOP[®] est un dérivé hémi-synthétique de la podophylotoxine inhibiteur de la topo-isomérase II, perturbant ainsi les phénomènes de réplication, de transcription et de réparation de l'ADN.

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DÉLIVRANCE

Médicament à prescription hospitalière, réservée aux hématologues, oncologues, ou médecins compétents en cancérologie.

Il est disponible en pharmacie de ville.

PRESENTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES

Il est disponible sous forme de capsules molles de 25 mg (boîtes de 40 capsules) et de 50 mg (boîtes de 20 capsules).

Conserver ce médicament dans un endroit frais et sec, à une température inférieure à 25°C, hors de la portée des enfants.

POSOLOGIE

Posologie recommandée:

- 80 à 300 mg/m²/jour en cures de 3 à 5 jours tous les 21 à 28 jours
- 50 à 100 mg/m²/jour en cure de 21 sur 28 jours.
- Voir en administration continue.

INTERACTIONS

Associations contre-indiquées :

- Vaccin contre la fièvre jaune : risque de maladie vaccinale généralisée mortelle.

Associations déconseillées :

- Vaccins vivants atténués : risque de maladie vaccinale généralisée, éventuellement mortelle.

- Vaccins inactivés : il est préférable d'attendre un délai de 3 mois après la chimiothérapie (risque de diminution de l'activité du vaccin sans augmentation des effets indésirables).

- Phénytoïne : risque de survenue de convulsions ou risque d'augmentation de la toxicité ou de la perte d'efficacité du cytotoxique due à l'augmentation du métabolisme hépatique par la phénytoïne.

Associations à prendre en compte :

- Ciclosporine et tacrolimus : immunodépression excessive avec risque de lymphoprolifération.

- Tisanes ou préparation de phytothérapie : attention aux plantes dont les interactions sont mal connues.

EFFETS INDESIRABLES

Nausées et vomissements	⇒ Boire entre les repas. Eviter les aliments frits, gras ou épicés. Manger lentement. Faire plusieurs petits repas légers.	⇒ Antiémétique standard éventuel. Ne pas reprendre la prise ou doubler la suivante en cas de vomissements. Si plus d'un vomissement par 24h, arrêt du traitement et adaptation posologique avec le spécialiste.
Leucopénie, thrombopénie	⇒ Surveillance de l'hémogramme avant et après chaque administration.	⇒ En cas de leucopénies sévères, surveillance plus rapprochée de l'hémogramme (tous les 2 jours). Voir avec l'oncologue pour une diminution des posologies et mise en place de mesures prophylactiques (antibiotiques et/ou antifongiques, facteurs de croissance granulocytaires).
Mucites, stomatites	⇒ Eviter les aliments épicés, chauds ou acides. Une bonne hygiène buccale est recommandée (bains de bouche au bicarbonate de sodium).	⇒ En cas de fièvre associée, en cas de difficultés à s'alimenter : arrêt du traitement et thérapeutique adaptée.



RECOMMANDATIONS À DONNER AUX PATIENTS

L'étoposide peut être administré **pendant ou en dehors des repas** avec un verre d'eau.

Il est conseillé au patient de s'aider d'un calendrier pour repérer les prises.

Les capsules ne doivent pas être broyées, écrasées ou coupées.

Ne pas jeter les emballages entamés ni les comprimés dans votre poubelle.

Le patient peut rapporter les comprimés restants au **pharmacien** pour l'**aider dans les prises**.

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes. **Le patient doit préciser à son médecin ou pharmacien, les médicaments (avec ou sans ordonnance), plantes ou tisanes qu'il prend ou qu'il souhaite prendre.**

Une contraception efficace doit être maintenue au cours du traitement et un test de grossesse doit être effectué avant le traitement chez la femme en âge de procréer.

Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.

En cas d'oubli d'une prise, le patient ne doit pas prendre de dose supplémentaire, ni doubler la prise suivante. Prendre la dose habituellement prescrite le jour suivant et noter cet oubli dans le carnet de suivi.

Contactez rapidement le médecin en cas de :

- difficulté à respirer ou de modification du rythme respiratoire (risque de pneumopathie interstitielle et de fibrose pulmonaire)
- anurie ou hématurie, douleur vésicale
- fièvre/signes infectieux pour réaliser une NFS en urgence.