



## PRESCRIPTION ET DÉLIVRANCE



Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre médecin hospitalier spécialiste en oncologie médicale ou en cancérologie.

Il est disponible dans **les pharmacies de ville**.

**Ne jetez pas les boîtes entamées** ni les comprimés restants dans votre poubelle. Merci de les rapporter à votre pharmacien.

## PRESENTATIONS ET CONSERVATION



Le médicament est disponible sous la forme de boîte de **63 comprimés** en plaquettes de **21 comprimés** dosés à 20 mg (5 643 € HT).z

Conservez ce médicament à une température inférieure à 25°C. Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants.

## MODE D'EMPLOI



La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste. La dose habituelle est de **60 mg par jour (soit 3 comprimés) pendant 21 jours suivi d'une période de 7 jours sans traitement. Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.**

Les comprimés de COTELLIC® **sont à avaler entiers**, avec un verre d'eau en **une prise par jour** au cours ou en dehors d'un repas. Essayez de les prendre **chaque jour à la même heure**.

Les comprimés ne doivent ni être écrasés, ni coupés ou croqués.

Du fait de la prise non continue, vous pouvez vous aider d'un calendrier :

Du 1er au 21ème jour : prise des comprimés

Puis du 22ème au 28ème jour : pas de prise de COTELLIC®. Puis recommencez comme au 1er jour.

Le **pamplemousse** (jus, pulpe, fruit) doit être évité pendant votre traitement par COTELLIC®

## INTERACTIONS



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes. Par exemple, il faut éviter la prise du **millepertuis** (*Hypericum perforatum*) sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, gouttes...)

**N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.** En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

## EFFETS INDESIRABLES



**Nausées et vomissements,  
perte d'appétit**



Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers. Les aliments gras, frits et épicés ne sont pas conseillés. Buvez plutôt entre les repas.



Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements en respectant les doses.

Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (à partir de deux vomissements par jour).

<b>Troubles du transit</b>	⇒ Si diarrhées, évitez les aliments épicés et frits et limitez la consommation de boisson contenant de la caféine Si constipation, préférez une alimentation riche en fibres et pratiquez quelques exercices légers	⇒ Prenez les médicaments prescrits en respectant les doses. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (persistance de diarrhées de plus de 48h ou de constipation de plus de 3 jours).
<b>Fatigue</b>	⇒ Il est normal d'être fatigué au cours du traitement. Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sainement). Respectez des temps de repos dans la journée, mais essayez de conserver une activité même modérée.	⇒ Soyez à l'écoute de votre corps. Prudence en cas de conduite de véhicules. En cas de fatigue persistante inhabituelle, informez votre médecin prescripteur pour adaptation des doses
<b>Gonflement des membres</b>	⇒ Elevé vos pieds quand vous êtes assis. Les vêtements serrés sont déconseillés. Maintenez une alimentation à faible teneur en sel.	⇒ En cas de gonflement des jambes, élevez les pieds en position assise et portez des bas de contention. Si essoufflement, prise de poids rapide et inattendue, prévenir le médecin prescripteur pour bilan cardiologique et respiratoire. Surveillez régulièrement votre poids.
<b>Maux de tête, palpitations, bourdonnements d'oreille</b>	⇒ Mesurez régulièrement votre tension. Faites de l'exercice, contrôlez votre poids. Limitez la consommation de sel et d'alcool.	⇒ Contactez votre médecin si ces signes surviennent. Un traitement par anti-hypertenseur vous sera prescrit si besoin.
<b>Eruption cutanée</b>	⇒ Préférez un savon doux sans alcool et une crème hydratante. Evitez les expositions au soleil.	⇒ Informez votre médecin, des traitements médicaux peuvent vous soulager
<b>Atteintes oculaires (vision floue, œdème périorbitaire...)</b>	⇒	⇒ En cas de baisse de la vue, brutale ou progressive, appeler rapidement le médecin.
<b>Arthralgies – myalgie</b>	⇒ Boire régulièrement. Eviter les gestes répétitifs et les efforts physiques importants.	⇒ Traitement symptomatique par paracétamol. Supplémentation possible par calcium, magnésium et vitamine B6.
<b>Toxicité cardiaque</b>	⇒	⇒ Votre fonction cardiaque sera régulièrement évaluée.

**Si vous ressentez des effets non mentionnés, n'hésitez pas à en parler à votre oncologue, votre médecin généraliste ou votre pharmacien. Des frissons de la fièvre, des saignements et des modifications biologiques (augmentation taux sanguins de certaines enzymes) peuvent survenir pendant le traitement, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin.**

## QUELQUES CONSEILS

Contactez rapidement le médecin en cas de :

- éruption cutanée sévère ou atteinte des muqueuses
- fièvre brutale supérieure à 38°C
- problèmes cardiaques : essoufflement, vertiges, étourdissement, fatigue, accélération du rythme cardiaque et gonflement au niveau des jambes.
- problèmes oculaires : vision trouble, vision déformée, déficience visuelle
- saignements

N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.

En cas d'oubli d'une prise de moins de 12 heures, prenez la dose.

**En cas d'oubli d'une prise de plus de 12 heures, ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle, le lendemain.**

**Evitez l'exposition prolongée** au soleil et **protégez-vous** si vous devez le faire.

Ce médicament contient du **lactose**. En cas d'intolérance (ballonnements, douleurs ou crampes abdominales, diarrhée ou constipation, troubles de la concentration), contactez votre médecin.

Il est déconseillé de prendre COTELLIC® pendant la **grossesse** et **l'allaitement**.

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

*Ce document d'information n'a pas de valeur contractuelle : malgré le soin apporté à la rédaction de ces fiches, une erreur ou une coquille a pu s'y glisser et ne pourra pas être imputée aux auteurs.*