



# ERIVEDGE® Vismodegib

PATIENT

## PRESCRIPTION ET DÉLIVRANCE



Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre **médecin hospitalier spécialisé en oncologue**. Il est disponible **dans les pharmacies de ville**.

Lorsque vous quittez votre domicile, pensez à prendre vos ordonnances et faites activer votre dossier pharmaceutique.

**Si votre traitement est définitivement interrompu, ne jetez pas les boîtes entamées, ni les comprimés restants dans votre poubelle**, mais rapportez-les à votre médecin prescripteur.

## PRESENTATIONS ET CONSERVATION



Flacon de 28 gélules dosées à 150 mg. (4 144,00 € HT)

Conservez ce médicament à **une température inférieure à 25°C**, à l'abri de la lumière et de l'humidité. **Gardez-le hors de la portée et de la vue des enfants**.

## MODE D'EMPLOI



La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste. Elle est habituellement de 150 mg par jour. **Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement**.

Les gélules d'ERIVEDGE® sont à avaler entières avec un grand verre d'eau **une fois par jour avec ou sans nourriture**. Essayez de le prendre chaque jour à la même heure. Votre pharmacien ou médecin peut vous aider pour la prise de votre traitement.

Les comprimés ne doivent être ni écrasés, ni coupés ou croqués.

## INTERACTIONS



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes. Par exemple, il faut éviter la prise du **millepertuis** (*Hypericum perforatum*) sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, gouttes,...) ainsi que le Desmodium® qui diminuent l'efficacité.

**N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.**

En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien. Evitez les médicaments utilisés pour traiter les brûlures d'estomac (antiacides et anti-sécrétoires). En cas de besoin, demandez nous conseil.

## EFFETS INDESIRABLES



**Douleurs articulaires, musculaires**



Reposez-vous souvent. Faites des exercices légers, évitez les mouvements répétitifs et les efforts physiques importants.



Prenez un comprimé de Paracétamol si nécessaire. Informez votre médecin si les douleurs persistent.

**Nausées, vomissements**



Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas



Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements en respectant les doses. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (à partir de deux vomissements par jour)

**Perte d'appétit, perte de goût, perte de poids**



Prenez plusieurs petites collations par jour (aliments que vous aimez), mangez lentement, buvez beaucoup.



Privilégiez les aliments à fort pouvoir calorique : ajouter du beurre, de l'huile, de la crème fraîche, du fromage râpé, du miel...  
Demandez les conseils d'une diététicienne. En cas de perte de poids, parlez-en avec votre médecin

<b>Modification du bilan sanguin</b>	⇒	Une élévation des enzymes hépatiques en particulier est possible	⇒	Un bilan sanguin doit être effectué régulièrement et les résultats communiqués à votre médecin
<b>Démangeaisons</b>	⇒	Préférez un savon doux et un agent hydratant. Évitez les expositions prolongées au soleil, utilisez une protection solaire écran total.	⇒	Contactez votre médecin si ces signes surviennent.
<b>Diarrhée</b>	⇒	Évitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.	⇒	Suivez la prescription médicale contre la diarrhée. Buvez si possible 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes cuites et les bananes. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (plus de 3 selles liquides par jour). Privilégiez une alimentation riche en fibres : légumes verts, fruits et fruits secs. En cas de constipation prolongée par rapport à vos habitudes, contactez votre médecin
<b>Constipation</b>	⇒	Buvez régulièrement de l'eau. Pratiquez quelques exercices légers.	⇒	Privilégiez une alimentation riche en fibres : légumes verts, fruits et fruits secs. En cas de constipation prolongée par rapport à vos habitudes, contactez votre médecin
<b>Fatigue</b>	⇒	Il est normal d'être fatigué au cours du traitement. Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sainement). Respectez des temps de repos dans la journée, mais essayez de conserver une activité même modérée.	⇒	Soyez à l'écoute de votre corps. Prudence en cas de conduite de véhicules. En cas de fatigue persistante inhabituelle, informez votre médecin.

**Une perte de cheveux et une absence de menstruation peuvent survenir pendant le traitement, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin.**

**Si vous ressentez des effets non mentionnés, n'hésitez pas à en parler à votre prescripteur, généraliste ou pharmacien.**

**Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.**

## QUELQUES CONSEILS



**Contactez rapidement le médecin** en cas de :

- Signes faisant suspecter une atteinte hépatique (douleur abdominale, jaunissement de la peau, urines foncées ou démangeaisons)
- Signes infectieux (fièvre, toux, frissons ...)

**Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.**

**Si vous avez oublié de prendre vos gélules d'ERIVEDGE® depuis plus de 12 heures, ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure normale, le lendemain.**

Erivedge® **ne doit pas être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.** Ils sont interdits jusqu'à 24 mois après la dernière dose.

Utilisez **2 moyens différents de contraception** pendant le traitement et au moins jusqu'à 2 ans (pour les femmes) et 2 mois (pour les hommes) après l'arrêt du traitement.

Pour les femmes, la prescription, la dispensation initiale et le renouvellement d'Erivedge® doivent avoir lieu dans les 7 jours qui suivent un test de grossesse négatif par un dosage des  $\beta$ -HCG plasmatiques.

Évitez l'**exposition prolongée au soleil** et **protégez-vous** si vous devez le faire.

*Ce document d'information n'a pas de valeur contractuelle : malgré le soin apporté à la rédaction de ces fiches, une erreur ou une coquille a pu s'y glisser et ne pourra pas être imputée aux auteurs.*