



ERLEADA® apalutamide

PATIENT

PRESCRIPTION ET DÉLIVRANCE



Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre **médecin hospitalier cancérologue**. Il est disponible **uniquement dans les pharmacies hospitalières**.

Si votre traitement est définitivement interrompu, ne jetez pas les boîtes entamées, ni les comprimés restants dans votre poubelle, mais rapportez-les à votre médecin prescripteur.

PRESENTATIONS ET CONSERVATION



Boîtes de 120 comprimés pelliculés dosés à 60 mg.

Conservez ce médicament à **une température inférieure à 25°C**, à l'abri de la lumière et de l'humidité. **Gardez-le hors de la portée et de la vue des enfants.**

MODE D'EMPLOI



La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste.

La dose habituelle est de 240 mg, soit 4 comprimés, tous les jours.

Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.

Le comprimé d'ERLEADA® est à avaler avec un verre d'eau **une fois par jour**, pendant ou en dehors du repas. Essayez de le prendre chaque jour à peu près au même moment.

Si vous avez un problème, votre pharmacien ou médecin peut vous aider.
Les comprimés ne doivent être ni écrasés, ni coupés ou croqués.

INTERACTIONS



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes. Par exemple, il faut éviter la prise du **millepertuis** (*Hypericum perforatum*), le Desmodium® ou de **pamplemousse** sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, gouttes,...).

N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.

En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

EFFETS INDESIRABLES



Fatigue	⇒ La fatigue est normale, mais ne doit pas vous empêcher d'essayer de conserver une activité physique Se fixer des priorités	⇒ Prudence en cas de conduite de véhicules Si fatigue persistante, voir médecin traitant
Eruption cutanée, prurit	⇒ Préférez un savon doux sans alcool ni parfum et une crème hydratante. Surveillez l'apparition de lésions de la peau, verrues ou autres anomalies cutanées.	⇒ Une crème hydratante peut soulager les symptômes. Prévenez votre médecin si ces signes surviennent, un traitement médicamenteux peut vous être prescrit. Les éruptions cutanées sont généralement réversibles à l'arrêt du traitement.
Arthralgies – myalgies, fractures	⇒ Boire régulièrement. Eviter les gestes répétitifs et les efforts physiques importants.	⇒ Traitement symptomatique par paracétamol. Supplémentation possible par calcium, magnésium et vitamine B6. Consulter votre médecin en cas de douleurs osseuses ou articulaires.

D'autres effets indésirables peuvent apparaître tels qu'une hypothyroïdie, des modifications des taux de cholestérol, et de triglycérides peuvent survenir.

QUELQUES CONSEILS



Contactez rapidement le médecin en cas de :

- signes infectieux (fièvre, toux, frissons ...)
- convulsions
- essoufflement, œdèmes des membres
- asthénie
- chutes répétitives

N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.

Si vous avez oublié de prendre vos comprimés d'ERLEADA® depuis plus de 12h, ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle.

Si vous pensez avoir pris accidentellement plus que la dose prescrite, contactez immédiatement votre médecin.

Ce document d'information n'a pas de valeur contractuelle : malgré le soin apporté à la rédaction de ces fiches, une erreur ou une coquille a pu s'y glisser et ne pourra pas être imputée aux auteurs.