



IBRANCE® Palbociclib

PRESCRIPTION ET DÉLIVRANCE



Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre **médecin spécialiste en oncologie ou compétent en cancérologie**.

Il est disponible uniquement dans les **pharmacies de ville**.

Ne jetez pas les boîtes entamées, ni les gélules restantes dans votre poubelle. Rapportez-les à votre médecin.

Votre pharmacien peut vous aider dans la prise de votre traitement.

PRESENTATIONS ET CONSERVATION



Trois présentations sont disponibles sous la forme de boîte de 21 gélules :

- dosées à 75 mg (4006 € HT)
- dosées à 100 mg (4006 € HT)
- dosées à 125 mg (4006 € HT)

Conservez ce médicament à **température inférieure à 25 °C**

Gardez-le hors de la portée des enfants

MODE D'EMPLOI



La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste.

La dose habituelle est de 125 mg par jour (1 gélule) pendant 21 jours suivi d'une période de 7 jours sans traitement (cycle complet de 28 jours).

Les gélules sont à avaler entières, avec un verre d'eau en une prise par jour **au cours d'un repas**. Essayez de les prendre chaque jour à la même heure.

Les gélules ne doivent être ni ouvertes, ni mâchées ou broyées.

Le **pamplemousse** (jus, pulpe) doit être évité pendant votre traitement par palbociclib.

INTERACTIONS



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments plantes ou tisanes. Par exemple, il faut éviter la prise de **millepertuis** (*Hypericum perforatum*) sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, gouttes...).

Prenez l'avis de votre médecin ou pharmacien pour tout médicament, plante ou tisane que vous souhaitez prendre.

EFFETS INDESIRABLES



Modification du bilan sanguin	⇒ Un bilan sanguin doit être effectué régulièrement et les résultats communiqués à votre médecin	⇒ Prenez votre température en cas de doute En cas de signes infectieux (fièvre, toux), prévenez votre médecin et faites un bilan sanguin
Signes d'infection : fièvre, toux, frissons, maux de gorge, brûlures urinaires	⇒ Limitez les contacts rapprochés avec les personnes ayant une infection contagieuse Se laver les mains et désinfecter toute plaie soigneusement Bien respecter le rythme des bilans	⇒ Voir le médecin traitant en cas de fièvre supérieure à 38°C
Fatigue	⇒ La fatigue est normale, mais ne doit pas vous empêcher d'essayer de conserver une activité physique Se fixer des priorités	⇒ Prudence en cas de conduite de véhicules Si fatigue persistante, voir médecin traitant

**Troubles digestifs :
nausées, vomissements,
diarrhée, anorexie (très
rare)**



Fractionnez vos repas
Adaptez vos aliments
Mangez lentement



En cas de signes persistants (plus de 2 jours) ou importants (plus de 2 vomissements et plus de 3 diarrhées), prévenir votre médecin.

**Aphtes, saignements
des muqueuses (très
rare)**



Utilisez une brosse à dents souple, des bains de bouche sans alcool
Attention aux prises d'aspirine, d'anti-inflammatoires



Si douleurs diffuses, buccales voir votre médecin pour une prescription antalgique.
Prévenir votre médecin si saignements de nez répétés.

Peuvent survenir : vision floue, sécheresse oculaire, perte des cheveux...

QUELQUES CONSEILS



Contactez votre médecin rapidement :

- **si essoufflement ou vertiges**
- **si fièvre, frissons, malaise**
- **saignement**

Si vous avez oublié de prendre vos gélules de palbociclib depuis plus de 6h, ne prenez pas la dose manquée. Reprendre la dose suivante, à l'heure normale, le lendemain

En cas de vomissements, ne pas reprendre la dose

Ce médicament contient du lactose : en cas d'intolérance (ballonnements, douleurs ou crampes abdominales...), contactez votre médecin.

Ce traitement est déconseillé pendant la grossesse et l'allaitement.

Ce document d'information n'a pas de valeur contractuelle : malgré le soin apporté à la rédaction de ces fiches, une erreur ou une coquille a pu s'y glisser et ne pourra pas être imputée aux auteurs.