



PRESCRIPTION ET DÉLIVRANCE



Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre **médecin hospitalier oncologue**. Il est disponible **dans les pharmacies de ville**. Lorsque vous quittez votre domicile, pensez à prendre vos ordonnances et faites activer votre dossier pharmaceutique.

Si votre traitement est définitivement interrompu, ne jetez pas les boîtes entamées ni les comprimés restants, mais rapportez-les à votre médecin prescripteur.

PRESENTATIONS ET CONSERVATION



INLYTA[®] se présente en plaquettes thermoformées de 14, 28 ou 56 comprimés sous 2 dosages :

- Comprimé pelliculé rouge ovale de **1 mg et 3 mg** (783,46€, 2239,68€)

- Comprimé pelliculé rouge triangulaire de **5 mg et 7 mg** (3646,21€, 5052,74€)

Conservez ce médicament à **une température inférieure à 25°C**.

Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants.

MODE D'EMPLOI



La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste. **La dose initiale est de 5 mg deux fois par jour.**

Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.

Les comprimés INLYTA[®] sont à avaler entiers avec **un verre d'eau en deux prises par jour** au cours ou en dehors des repas à 12 heures d'intervalle. **Essayez de les prendre chaque jour à la même heure.**

Les comprimés ne doivent ni être écrasés, ni coupés ou croqués.

INTERACTIONS



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes.

Evitez la prise du **millepertuis** (*Hypericum perforatum*) sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, gouttes...)

Evitez le **pamplemousse** (jus, pulpe) pendant votre traitement par INLYTA[®] car il augmente sa toxicité.

Evitez les médicaments utilisés pour traiter les brûlures d'estomac (anti-acides). En cas de besoin, ces médicaments doivent être pris à distance d'INLYTA[®]. Demandez conseil à votre pharmacien.

N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.

En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

EFFETS INDESIRABLES



Hypertension



En cas de maux de tête ou palpitations, mesurez régulièrement votre tension. Faites de l'exercice, contrôlez votre poids. Limitez la consommation de sel et d'alcool.



Contactez votre médecin si ces signes surviennent. Un traitement par antihypertenseur vous sera prescrit si besoin.

Nausées et vomissements



Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers. Les aliments gras, frits et épicés ne sont pas conseillés. Buvez plutôt entre les repas.



Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements en respectant les doses.

Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (à partir de deux vomissements par jour).

Diarrhée	⇒	Evitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.	⇒	Suivez la prescription médicale contre la diarrhée. Buvez si possible 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes cuites et les bananes. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (plus de 3 diarrhées par jour).
Perte d'appétit	⇒	Prenez plusieurs petites collations par jour (aliments que vous aimez), mangez lentement, buvez beaucoup.	⇒	Privilégiez les aliments à fort pouvoir calorique : ajouter du beurre, de l'huile, de la crème fraîche, du fromage râpé, du miel... Demandez les conseils d'une diététicienne. En cas de perte de poids, parlez-en avec votre médecin.
Fatigue	⇒	Il est normal d'être fatigué au cours du traitement. Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sainement). Respectez des temps de repos dans la journée, mais essayez de conserver une activité même modérée.	⇒	Soyez à l'écoute de votre corps. Prudence en cas de conduite de véhicules. En cas de fatigue persistante inhabituelle, informez votre médecin.
Eruptions et sécheresse cutanées	⇒	Préférez un savon doux sans alcool et une crème hydratante. Evitez les expositions prolongées au soleil.	⇒	Informez votre médecin, des traitements médicaux peuvent vous soulager.
Picotement, gonflement, rougeur voire douleur de la paume des mains et de la plante des pieds	⇒	Evitez le soleil et l'eau chaude. Les vêtements et les chaussures trop serrés ne sont pas conseillés. Si possible, évitez les travaux irritants pour les mains et l'utilisation des pansements adhésifs. Utilisez plutôt un savon doux sans parfum. La station debout et les marches prolongées ne sont pas conseillées. Une consultation chez un pédicure pourrait être utile avant et après le traitement.	⇒	Il s'agit d'un syndrome mains-pieds. Trempez les mains et les pieds dans l'eau fraîche, puis séchez sans frotter. Appliquez des crèmes hydratantes sur les zones atteintes : contactez votre médecin.
Aphtes et altération du goût	⇒	Evitez les aliments acides, épicés et irritants. Utilisez une brosse à dents souple, un dentifrice doux (sans menthol) et un bain de bouche sans alcool.	⇒	Demandez conseil à votre pharmacien. En cas d'apparition de douleurs diffuses dans la bouche ou de brûlure : contactez votre médecin.
Troubles de la voix	⇒		⇒	Parlez-en à votre médecin

Si vous ressentez des effets non mentionnés, n'hésitez pas à en parler à votre prescripteur ou à votre généraliste. Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

QUELQUES CONSEILS



Contactez rapidement le médecin en cas de :

- gonflement, rougeur et douleur de la paume des **mains** et de la plante des **pieds**.
- maux de ventre ou d'estomac intenses qui ne disparaissent pas.

N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.

Si vous avez oublié de prendre vos comprimés INLYTA® depuis plus de 4 heures, ou en cas de vomissements, ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure normale.

Evitez l'**exposition prolongée au soleil** et **protégez-vous** si vous devez le faire.