



KISQALI® Ribociclib

PATIENT

PRESCRIPTION ET DÉLIVRANCE



Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre **médecin spécialiste en oncologie ou compétent en cancérologie**. Il est disponible uniquement dans les **pharmacies de ville**.

Ne jetez pas les boîtes entamées, ni les gélules restantes dans votre poubelle. Rapportez-les à votre médecin.

Votre pharmacien peut vous aider dans la prise de votre traitement.

PRESENTATIONS ET CONSERVATION



Trois présentations sont disponibles sous la forme de boîtes de :

- 21 comprimés dosés à 200 mg (802,33 € HT)
- 42 comprimés dosés à 200 mg (1 604,67 € HT)
- 63 comprimés dosés à 200 mg (2 407,00 € HT)

Conservez ce médicament à **température inférieure à 25 °C**

Gardez-le hors de la portée des enfants

MODE D'EMPLOI



La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste.

La dose habituelle est de **600 mg (3 comprimés) en une prise par jour pendant 21 jours** suivis d'une période de 7 jours sans traitement (cycle complet de 28 jours).

Les comprimés sont à avaler entiers, avec un verre d'eau **au cours ou en dehors d'un repas**. Essayez de les prendre chaque jour à la même heure.

Les comprimés ne doivent être ni mâchés ou broyés.

INTERACTIONS



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments plantes ou tisanes. Par exemple, il faut éviter la prise de **millepertuis** (*Hypericum perforatum*) sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, gouttes...).

Prenez l'avis de votre médecin ou pharmacien pour tout médicament, plante ou tisane que vous souhaitez prendre.

Le **pamplemousse** (jus, pulpe) et la **grenade** doivent être évités pendant votre traitement par ribociclib.

EFFETS INDESIRABLES



Modification du bilan sanguin	⇒	Un bilan sanguin doit être effectué régulièrement et les résultats communiqués à votre médecin	⇒	Prenez votre température en cas de doute En cas de signes infectieux (fièvre, toux), prévenez votre médecin et faites un bilan sanguin
Signes d'infection : fièvre, toux, frissons, maux de gorge, brûlures urinaires	⇒	Limitez les contacts rapprochés avec les personnes ayant une infection contagieuse Se laver les mains et désinfecter toute plaie soigneusement Bien respecter le rythme des bilans	⇒	Voir le médecin traitant en cas de fièvre supérieure à 38°C
Fatigue	⇒	La fatigue est normale, mais ne doit pas vous empêcher d'essayer de conserver une activité physique Se fixer des priorités	⇒	Prudence en cas de conduite de véhicules Si fatigue persistante, voir médecin traitant

Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhée, anorexie (très rare)	⇒	Fractionnez vos repas Adaptez vos aliments Mangez lentement	⇒	En cas de signes persistants (plus de 2 jours) ou importants (plus de 2 vomissements et plus de 3 diarrhées), prévenir votre médecin.
Aphtes, saignements des muqueuses (très rare)	⇒	Utilisez une brosse à dents souple, des bains de bouche sans alcool Attention aux prises d'aspirine, d'anti-inflammatoires	⇒	Si douleurs diffuses, buccales voir votre médecin pour une prescription antalgique. Prévenir votre médecin si saignements de nez répétés.
Douleurs extrémités, symptômes cardiaques	⇒	Surveillance régulière de votre cœur (électrocardiogramme, analyses pour sels minéraux : potassium, calcium, magnésium,...) et de votre tension.	⇒	Prévenez votre médecin dès l'apparition de ces signes.

Peuvent survenir : altération du goût, vision floue, sécheresse oculaire, perte des cheveux...

QUELQUES CONSEILS



Contactez votre médecin rapidement :

- **si essoufflement ou vertiges**
- **si fièvre, frissons, malaise**
- **saignements inhabituels**

Si vous avez oublié de prendre vos comprimés de ribociclib depuis plus de 6h, ne prenez pas la dose manquée. Reprendre la dose suivante, à l'heure normale, le lendemain.

En cas de vomissements, ne pas reprendre la dose.

Ce médicament contient du **soja et de l'arachide** : en cas d'intolérance (ballonnements, douleurs ou crampes abdominales...), contactez votre médecin.

Ce médicament est contre-indiqué chez les patients présentant une hypersensibilité aux arachides.

Ce traitement est déconseillé pendant **la grossesse et l'allaitement**.

Ce document d'information n'a pas de valeur contractuelle : malgré le soin apporté à la rédaction de ces fiches, une erreur ou une coquille a pu s'y glisser et ne pourra pas être imputée aux auteurs.