



LORVIQUA® Lorlatinib

PATIENT

PRESCRIPTION ET DÉLIVRANCE



Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre **médecin hospitalier oncologue**. Il est disponible **dans les pharmacies de ville**. Lorsque vous quittez votre domicile, pensez à prendre vos ordonnances et faites activer votre dossier pharmaceutique.

Si votre traitement est définitivement interrompu, ne jetez pas les boîtes entamées, ni les comprimés restants dans votre poubelle, mais rapportez-les à votre médecin prescripteur.

PRESENTATIONS ET CONSERVATION



Boîtes de 120 comprimés dosés à 25mg et boîtes de 30 comprimés dosés à 100 mg.

Conservez ce médicament à **une température inférieure à 25°C**, à l'abri de la lumière et de l'humidité. **Gardez-le hors de la portée et de la vue des enfants.**

MODE D'EMPLOI



La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste. Elle est habituellement de 100 mg par jour. **Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.**

Les comprimés de Lorviqua® sont à avaler avec un grand verre d'eau **une fois par jour**. Il peut être pris **avec ou sans nourriture**. Essayez de le prendre chaque jour à la même heure. Votre pharmacien ou médecin peut vous aider pour la prise de votre traitement.

Les comprimés ne doivent être **ni écrasés, ni coupés ou croqués**.

Le **pamplemousse** (jus, pulpe) doit être évité pendant votre traitement par Lorviqua®, car il majore les toxicités.

INTERACTIONS



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes. Par exemple, il faut éviter la prise du **millepertuis** (*Hypericum perforatum*) sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, gouttes,...) ainsi que le Desmodium® qui diminuent l'efficacité.

N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.

En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien. Evitez les médicaments utilisés pour traiter les brûlures d'estomac (antiacides et anti-sécrétoires). En cas de besoin, demandez nous conseil.

EFFETS INDESIRABLES



Modification du bilan sanguin



Un bilan sanguin doit être effectué régulièrement et les résultats communiqués à votre médecin.



Prenez votre température en cas de doute.

En cas de signes infectieux (fièvre, toux), prévenez votre médecin et faites un bilan sanguin.

Diarrhée



C'est un effet qui arrive souvent : évitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.



Suivez la prescription médicale contre la diarrhée. Buvez si possible 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes cuites et les bananes.

Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (plus de 3 selles liquides par jour).

Fatigue		Il est normal d'être fatigué au cours du traitement. Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sainement). Respectez des temps de repos dans la journée, mais essayez de conserver une activité même modérée.		Soyez à l'écoute de votre corps. Prudence en cas de conduite de véhicules. En cas de fatigue persistante inhabituelle, informez votre médecin.
Gonflement des bras et des jambes		Elevez vos pieds quand vous êtes assis. Les vêtements serrés sont déconseillés. Maintenez une alimentation à faible teneur en sel.		Surveillez régulièrement votre poids. Si prise de poids rapide et inattendue, contactez le médecin
Maux de tête, palpitations, bourdonnements d'oreille		Mesurez régulièrement votre tension. Faites de l'exercice, contrôlez votre poids. Limitez la consommation de sel et d'alcool.		Contactez votre médecin si ces signes surviennent. Un traitement par antihypertenseur vous sera prescrit si besoin.

Il se peut que vous ressentiez des troubles à type d'anxiété, d'irritabilité, un ralentissement ou une humeur dépressive. Dans ce cas, prévenez votre médecin.

Si vous ressentez des effets non mentionnés, n'hésitez pas à en parler à votre prescripteur, généraliste ou pharmacien.

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

QUELQUES CONSEILS



Contactez rapidement le médecin en cas de :

- Difficulté à respirer
- Signes infectieux (fièvre, toux, frissons ...)

Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.

Si vous avez oublié de prendre vos comprimés de Lorviqua® depuis plus de 20 heures, ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure normale, le lendemain.

Évitez l'**exposition prolongée au soleil** et **protégez-vous** si vous devez le faire.

Ce document d'information n'a pas de valeur contractuelle : malgré le soin apporté à la rédaction de ces fiches, une erreur ou une coquille a pu s'y glisser et ne pourra pas être imputée aux auteurs.