



MEKTOVI® Binimetinib

PATIENT

PRESCRIPTION ET DÉLIVRANCE



Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre **médecin hospitalier oncologue**. Il est disponible **dans les pharmacies de ville**. Lorsque vous quittez votre domicile, pensez à prendre vos ordonnances et faites activer votre dossier pharmaceutique. **Si votre traitement est définitivement interrompu, ne jetez pas les boîtes entamées, ni les comprimés restants, mais rapportez-les à votre médecin prescripteur.**

PRESENTATIONS ET CONSERVATION



Boîtes de 84 comprimés dosés à 15mg.
A conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière, de l'humidité.
Gardez-le hors de la portée et de la vue des enfants.

MODE D'EMPLOI



La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste. La dose recommandée de binimetinib utilisée en association à encorafenib est de **45 mg 2 fois par jour, soit 3 comprimés par prise. Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.**

Les comprimés de MEKTOVI® sont à avaler **entiers** avec un verre d'eau, **en 2 prises par jour** pendant ou en dehors des repas. Essayez de **le prendre chaque jour à la même heure et de respecter environ 12h entre les 2 prises.**

La posologie classique est donc de 3 comprimés le matin et de 3 comprimés le soir. En fonction de la tolérance, cette posologie pourra être ajustée.

Les comprimés ne doivent être ni écrasés, ni coupés ou croqués.

INTERACTIONS



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes. Par exemple, il faut éviter la prise du **millepertuis** (*Hypericum perforatum*) sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, gouttes...). **N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.** En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

EFFETS INDESIRABLES



Signes d'infection : fièvre, frissons, toux, maux de gorge, brûlures urinaires	⇒	Limitez, si possible, les contacts avec les personnes ayant une infection contagieuse. Lavez-vous souvent les mains. Désinfectez soigneusement toute plaie. Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.	⇒	En cas de fièvre supérieure à 38°C, prévenez votre médecin.
Nausées et vomissements, perte d'appétit	⇒	Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers. Les aliments gras, frits et épicés ne sont pas conseillés. Buvez plutôt entre les repas.	⇒	Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements en respectant les doses. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (à partir de deux vomissements par jour).
Fatigue	⇒	Il est normal d'être fatigué au cours du traitement. Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sainement). Respectez des temps de repos dans la journée, mais essayez de conserver une activité même modérée.	⇒	Soyez à l'écoute de votre corps. Prudence en cas de conduite de véhicules. En cas de fatigue persistante inhabituelle, informez votre médecin prescripteur pour adaptation des doses
Eruption cutanée	⇒	Préférez un produit d'hygiène sans savon (surgras, syndet) et une crème hydratant. Evitez les expositions solaires, utilisez une	⇒	Une crème hydratante peut soulager les symptômes. Prévenez votre médecin si ces signes surviennent, un traitement médicamenteux peut vous être prescrit.

		protection solaire 50+		Les éruptions cutanées sont généralement réversibles à l'arrêt du traitement.
Maux de tête, palpitations, bourdonnements d'oreille	⇒	Mesurez régulièrement votre tension. Faites de l'exercice, contrôlez votre poids. Limitez la consommation de sel et d'alcool.	⇒	Contactez votre médecin si ces signes surviennent. Un traitement par antihypertenseur vous sera prescrit si besoin.
Arthralgies – myalgie	⇒	Boire régulièrement. Eviter les gestes répétitifs et les efforts physiques importants.	⇒	Traitement symptomatique par paracétamol. Supplémentation possible par calcium, magnésium et vitamine B6.
Œdèmes périphériques	⇒	Elever les pieds en position assise, alimentation à faible teneur en sel. Eviter de porter des vêtements serrés.	⇒	En cas de gonflement des jambes, élevez les pieds en position assise et portez des bas de contention. Si essoufflement, prévenir le médecin prescripteur pour bilan cardiologique et respiratoire
Dyspnée, toux	⇒	Surveillance médicale régulière et renforcée en cas d'infections respiratoires, irradiation, chimiothérapie.	⇒	En cas de majoration de toux ou de difficultés à respirer, prévenez votre médecin
Atteintes oculaires (vision floue, œdème périorbitaire...)	⇒		⇒	En cas de baisse de la vue, brutale ou progressive, appeler rapidement le médecin.

Des saignements inhabituels peuvent survenir (saignements de nez, gencives...).

Si vous ressentez des effets non mentionnés, n'hésitez pas à en parler à votre prescripteur ou à votre généraliste. Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

QUELQUES CONSEILS



Contactez rapidement le médecin en cas de :

- Eruption cutanée sévère ou atteinte des muqueuses
- Fièvre brutale supérieure à 38°C
- Signes hémorragiques
- Essoufflement, œdème des membres et douleur thoracique.
- Gêne respiratoire

Evitez l'**exposition au soleil** et **protégez-vous**.

N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.

Si vous avez oublié une prise depuis plus de 12 heures de MEKTOVI®, ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle, le lendemain.

Ce document d'information n'a pas de valeur contractuelle : malgré le soin apporté à la rédaction de ces fiches, une erreur ou une coquille a pu s'y glisser et ne pourra pas être imputée aux auteurs.