



RETSEVMO® Salpercatinib

PATIENT

PRESCRIPTION ET DÉLIVRANCE



Ce médicament est prescrit par votre **médecin hospitalier oncologue**. Il est disponible uniquement **en pharmacie hospitalière**.

Lorsque vous quittez votre domicile, pensez à prendre vos ordonnances et faites activer votre dossier pharmaceutique.

Si votre traitement est définitivement interrompu, ne jetez pas les boîtes entamées ni les comprimés restants mais rapportez-les à votre médecin prescripteur.

PRESENTATIONS ET CONSERVATION



Boîtes de 56 gélules dosées à 40 mg ou 80 mg.

A conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière, de l'humidité.

Gardez-le hors de la portée et de la vue des enfants.

MODE D'EMPLOI



La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste.

La dose habituelle est de 160mg, deux fois par jour, si votre poids est supérieur à 50 kg. Elle est de 120 mg en dessous de 50 kg.

Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.

Les gélules de RETSEVMO® sont à avaler entières de préférence avec de l'eau **en deux prises par jour, une prise le matin et une le soir, pendant ou en dehors des repas. Essayez de respecter 12 heures entre chaque prise.**

Les gélules ne doivent être ni ouvertes, ni mâchées, ni écrasées.

Le **pamplemousse** (jus, pulpe) doit être évité pendant le traitement par RETSEVMO®.

INTERACTIONS



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments plantes ou tisanes. Par exemple, il faut éviter la prise de **millepertuis** (*Hypericum perforatum*) sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, gouttes...).

Prenez l'avis de votre médecin ou pharmacien pour tout médicament, plante ou tisane que vous souhaitez prendre.

EFFETS INDESIRABLES



Modification du bilan sanguin	⇒	Un bilan sanguin doit être effectué régulièrement et les résultats communiqués à votre médecin.	⇒	En cas de signes infectieux (fièvre, toux) ou de saignements inhabituels, prévenir le médecin. Faire pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin. Buvez suffisamment.
Troubles hépatiques (élévation des taux d'ASAT et ALAT)	⇒	Il est recommandé de surveiller la fonction hépatique. Préférez des repas légers Evitez les aliments frits, gras, trop sucrés, l'alcool.	⇒	Consultez le médecin pour une adaptation du traitement (arrêt et réduction de posologie) en fonction des résultats.
Saignements inhabituels	⇒	En cas de saignements buccaux, préférez une brosse à dents souple. L'utilisation des thermomètres rectaux est à éviter. Certains médicaments sont déconseillés (aspirine, ibuprofène...).	⇒	Prévenez votre médecin. En cas de saignement de nez, penchez la tête en avant en exerçant une légère pression sur vos narines.
Fatigue	⇒	Il est normal d'être fatigué au cours du traitement. Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sainement). Respectez des temps de repos dans la journée, mais essayez de conserver une activité même modérée.	⇒	Soyez à l'écoute de votre corps. Prudence en cas de conduite de véhicules. En cas de fatigue persistante inhabituelle, informez votre médecin.
Signes d'infection : fièvre, frissons, toux, maux de gorge, brûlures urinaires	⇒	Limitez, si possible, les contacts avec les personnes ayant une infection contagieuse. Lavez-vous souvent les mains. Désinfectez soigneusement toute plaie. Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.	⇒	En cas de fièvre supérieure à 38°C, prévenez votre médecin.

Maux de tête, palpitations, bourdonnements d'oreille	⇒	Mesurez régulièrement votre tension. Surveillez régulièrement votre cœur. Faites de l'exercice, contrôlez votre poids. Limitez la consommation de sel et d'alcool.	⇒	Contactez votre médecin si ces signes surviennent. Un traitement par antihypertenseur vous sera prescrit si besoin.
Rougeur de la peau, acné, démangeaisons, assèchement...	⇒	Préférez un savon doux et un agent hydratant. Evitez les expositions prolongées au soleil, utilisez une protection solaire écran total. Possibilité d'une prévention par antibiothérapie.	⇒	En cas de symptômes persistants ou gênants, prévenez le médecin. Des traitements médicaux peuvent vous soulager.
Diarrhée	⇒	En cas de diarrhées, évitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.	⇒	Suivez la prescription médicale contre la diarrhée. Buvez si possible 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes cuites et les bananes. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants.
Constipation	⇒	Buvez régulièrement de l'eau. Pratiquez quelques exercices légers.	⇒	Buvez si possible 2 litres d'eau par jour. Privilégiez une alimentation riche en fibres : légumes verts, fruits et fruits secs. En cas de constipation prolongée par rapport à vos habitudes, contactez votre médecin.
Nausées et vomissements	⇒	Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas.	⇒	Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements en respectant les doses. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (à partir de deux vomissements par jour).
Perte d'appétit	⇒	Prenez plusieurs petites collations par jour (aliments que vous aimez), mangez lentement, buvez beaucoup.	⇒	Privilégiez les aliments à fort pouvoir calorique : ajouter du beurre, de l'huile, de la crème fraîche, du fromage râpé, du miel.... Demandez les conseils d'une diététicienne. En cas de perte de poids, parlez-en avec votre médecin.
Gonflement des bras et des jambes	⇒	Elevez vos pieds quand vous êtes assis. Les vêtements serrés sont déconseillés. Maintenez une alimentation à faible teneur en sel.	⇒	Surveillez régulièrement votre poids. Si prise de poids rapide et inattendue, contactez le médecin

Si vous ressentez des effets non mentionnés, n'hésitez pas à en parler à votre prescripteur, généraliste ou pharmacien. Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

QUELQUES CONSEILS

Contactez rapidement le médecin en cas de :

- Toux ou de difficulté à respirer, essoufflement, douleur thoracique.
- Signes infectieux (fièvre, toux, frissons....)
- Saignements inhabituels (apparition de selles noires, de saignements de nez, etc...)

Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.

Si vous avez oublié de prendre vos gélules de RETSEVMO®, ne prenez pas la dose manquée.

La dose suivante sera prise à l'heure normale, au moment venu.

En cas de vomissements, ne prenez pas de dose supplémentaire et ne doublez pas la prise suivante.

Evitez l'**exposition prolongée au soleil** et **protégez-vous** si vous devez le faire.

Ce document d'information n'a pas de valeur contractuelle : malgré le soin apporté à la rédaction de ces fiches, une erreur ou une coquille a pu s'y glisser et ne pourra pas être imputée aux auteurs.