



RUBRACA® Rucaparib

PATIENT

PRESCRIPTION ET DÉLIVRANCE



Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre **médecin hospitalier oncologue**. Il est disponible **en pharmacie de ville**. Lorsque vous quittez votre domicile, pensez à prendre vos ordonnances et faites activer votre dossier pharmaceutique.

Si votre traitement est définitivement interrompu, ne jetez pas les boîtes entamées ni les comprimés restants mais rapportez-les à votre médecin prescripteur.

PRESENTATIONS ET CONSERVATION



Une présentation est disponible sous la forme d'un flacon de 60 comprimés dosés à **200 mg, 250 mg ou 300 mg**.

Conservez ce médicament à **une température inférieure à 30°C**.

Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants.

MODE D'EMPLOI



La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste. **La dose initiale est de 1200 mg par jour soit 2 gélules de 300 mg matin et soir.**

Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.

Les comprimés de RUBRACA® sont à avaler entiers avec **un verre d'eau en deux prises par jour, pendant ou en dehors des repas**, en essayant de respecter 12h entre chaque prise.

Les comprimés ne doivent être ni mâchés, ni coupés, ni écrasés, ni dissous.

INTERACTIONS



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes.

N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.

En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.



EFFETS INDESIRABLES

Vertiges	⇒ Attention à l'effet conjoint avec l'alcool. Eviter les médicaments pouvant provoquer étourdissements ou confusion. Prudence en cas de conduite de véhicule.	⇒ Si ces symptômes persistent ou sont trop inconfortables, contactez votre médecin traitant.
Diarrhée	⇒ Evitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.	⇒ Suivez la prescription médicale contre la diarrhée. Buvez si possible 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes cuites et les bananes. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants.
Nausées et vomissements, diminution de l'appétit	⇒ Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas.	⇒ Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements en respectant les doses. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (à partir de deux vomissements par jour).
Fatigue	⇒ Il est normal d'être fatigué au cours du traitement. Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sainement). Respectez des temps de repos dans la journée, mais essayez de conserver une activité même modérée.	⇒ Soyez à l'écoute de votre corps. Prudence en cas de conduite de véhicules. En cas de fatigue persistante inhabituelle, informez votre médecin.

Modification du bilan sanguin (diminution des globules blancs, des plaquettes...)



Un bilan sanguin doit être effectué régulièrement et les résultats communiqués à votre médecin.



En cas de saignements inhabituels, prévenir le médecin. Faire pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.

QUELQUES CONSEILS



Contactez rapidement le médecin en cas de :

- signes infectieux (fièvre, toux, frissons ...)
- essoufflement, fatigue, pâleur, rythme cardiaque rapide
- ecchymoses ou saignements prolongés lors de blessures ou inhabituels

N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.

En cas de vomissements survenant après avoir pris RUBRACA®, **ne reprenez pas une nouvelle dose** mais prenez la dose suivante au moment prévu.

Si vous avez oublié de prendre vos comprimés de RUBRACA®, ne prenez pas la dose manquée.

Il est déconseillé de prendre **rucaparib** pendant la **grossesse et l'allaitement**. Utilisez une méthode contraceptive efficace jusqu'à 6 mois après la dernière dose de RUBRACA®.

Evitez l'**exposition prolongée au soleil** et **protégez-vous** si vous devez le faire.