



# STIVARGA® Régorafénib

PATIENT

## PRESCRIPTION ET DÉLIVRANCE



Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre **médecin hospitalier oncologue ou compétent en oncologie**. Il est disponible **dans les pharmacies de ville**.

Lorsque vous quittez votre domicile, pensez à prendre vos ordonnances et faites activer votre dossier pharmaceutique.

**Si votre traitement est définitivement interrompu, ne jetez pas les boîtes entamées, ni les comprimés restants dans votre poubelle, mais rapportez-les à votre médecin prescripteur.**

## PRESENTATIONS ET CONSERVATION



Boîte de 3 flacons de 28 comprimés rose clair dosés à 40 mg (2373,36€ HT).

Les médicaments se conservent 7 semaines après ouverture du flacon.

Conservez ce médicament à **une température inférieure à 25°C, à l'abri de la lumière**.

**Gardez-les hors de la vue et de la portée des enfants.**

## MODE D'EMPLOI



La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste.

La dose habituelle est de **160 mg (4 comprimés à 40mg) en 1 prise par jour, du 1er au 21ème jour, suivi d'un arrêt jusqu'au 28ème jour**.

Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité du traitement.

Les comprimés de STIVARGA® sont à avaler avec un verre d'eau en une prise par jour, de préférence **après le petit déjeuner**.

Essayez de le prendre chaque jour, à la même heure

Les comprimés ne doivent être ni écrasés, ni coupés ou croqués.

Le pamplemousse (jus, pulpe) doit être évité pendant votre traitement par STIVARGA®.

## INTERACTIONS



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes. Par exemple, il faut éviter la prise du **millepertuis** (*Hypericum perforatum*) sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, gouttes...) qui diminue l'efficacité.

**N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.**

En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

## EFFETS INDESIRABLES



### Diarrhée



C'est un effet qui arrive souvent : évitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.



Suivez la prescription médicale contre la diarrhée. Buvez si possible 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes cuites et les bananes.

Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (plus de 3 diarrhées par jour).

### Fatigue



Il est normal d'être fatigué au cours du traitement. Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sainement). Respectez des temps de repos dans la journée, mais essayez de conserver une activité même modérée.



Soyez à l'écoute de votre corps. Prudence en cas de conduite de véhicules. En cas de fatigue persistante inhabituelle, informez votre médecin.

<b>Signes d'infection</b>	⇒ Limitez les contacts rapprochés avec les personnes ayant une infection contagieuse Se laver les mains et désinfecter toute plaie soigneusement Bien respecter le rythme des bilans	⇒ Voir le médecin traitant en cas de fièvre supérieure à 38°C
<b>Aphtes, saignements des muqueuses</b>	⇒ Utilisez une brosse à dents souple, des bains de bouche sans alcool Attention aux prises d'aspirine, d'anti-inflammatoires	⇒ Si douleurs diffuses, buccales voir votre médecin pour une prescription antalgique Prévenir votre médecin si saignements de nez répétés
<b>Maux de tête, palpitations, bourdonnements d'oreille</b>	⇒ Mesurez régulièrement votre tension artérielle Faites de l'exercice, contrôlez votre poids	⇒ Un traitement antihypertenseur peut vous être prescrit
<b>Picotement, gonflement, rougeur, voire douleur de la paume des mains et de la plante des pieds</b>	⇒ Évitez soleil et eau trop chaude Évitez vêtements et chaussures trop serrés, les travaux irritants pour les mains, les stations debout et les marches prolongées. Utilisez plutôt un savon doux sans parfum. La station debout et les marches prolongées ne sont pas conseillées. Une consultation préventive chez un podologue pourrait être bénéfique	⇒ Trempez les mains et les pieds dans l'eau fraîche, puis séchez sans frotter Appliquez des crèmes hydratantes sur les zones atteintes

Une alopecie peut survenir pendant le traitement.

## QUELQUES CONSEILS



Contactez le médecin en cas :

- de selles noires, de saignements de nez et de crachats contenant du sang
- de diarrhées importantes
- essoufflement anormal, douleurs thoraciques
- coloration jaune de la peau (ictère), urines sombres, somnolence, désorientation

**N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.**

**En cas d'oubli d'une prise de moins de 12 heures**, prenez la dose de STIVARGA®.

**En cas d'oubli d'une prise de plus de 12 heures**, ne prenez pas la dose manquée.

La dose suivante sera prise à l'heure habituelle.

*Ce document d'information n'a pas de valeur contractuelle : malgré le soin apporté à la rédaction de ces fiches, une erreur ou une coquille a pu s'y glisser et ne pourra pas être imputée aux auteurs*