



TABRECTA® Capmatinib

PATIENT

PRESCRIPTION ET DÉLIVRANCE



Ce médicament est prescrit par votre **médecin hospitalier oncologue**. Il est disponible **à la pharmacie de l'hôpital**.

Si votre traitement est définitivement interrompu, ne jetez pas les boîtes entamées, ni les comprimés restants, mais rapportez-les à votre pharmacien hospitalier.

PRESENTATIONS ET CONSERVATION



Deux présentations sont disponibles sous la forme de boîtes de 56 comprimés à 150 mg et 200 mg

Conservez ce médicament à une **température inférieure à 25°C. Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants.**

MODE D'EMPLOI



La posologie habituelle est de 400 mg, deux fois par jour. Le capmatinib est administré par voie orale, deux fois par jour à peu près à la même heure chaque jour avec un verre d'eau pendant ou en dehors des repas.

Les comprimés ne doivent pas être mâchés, croqués ou coupés avant d'être avalés.

INTERACTIONS



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes.

N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.

Évitez les médicaments utilisés pour traiter les brûlures d'estomac. En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

EFFETS INDESIRABLES



Nausées et vomissements	⇒	Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers. Les aliments gras, frits et épicés ne sont pas conseillés. Buvez plutôt entre les repas.	⇒	Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements en respectant les doses. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (à partir de deux vomissements par jour).
Perte d'appétit	⇒	Prenez plusieurs petites collations par jour (aliments que vous aimez), mangez lentement, buvez beaucoup.	⇒	Privilégiez les aliments à fort pouvoir calorique : ajouter du beurre, de l'huile, de la crème fraîche, du fromage râpé, du miel.... Demandez les conseils d'une diététicienne. En cas de perte de poids, parlez-en avec votre médecin.
Fatigue	⇒	Il est normal d'être fatigué au cours du traitement. Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sainement). Respectez des temps de repos dans la journée, mais essayez de conserver une activité même modérée.	⇒	Soyez à l'écoute de votre corps. Prudence en cas de conduite de véhicules. En cas de fatigue persistante inhabituelle, informez votre médecin.
Modification du bilan hépatique (ASAT, ALAT)	⇒	Un bilan sanguin doit être effectué régulièrement et les résultats communiqués à votre médecin	⇒	Ces perturbations peuvent être associées à des démangeaisons et un jaunissement de la peau. Dans ce cas, prévenir le médecin. Faire pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.
Difficulté à respirer, toux, majoration des symptômes pulmonaires	⇒	En cas de signes d'infection, (fièvre, toux) prévenez votre médecin.	⇒	Contactez le médecin si ces signes surviennent, pour un examen médical approfondi

Œdèmes périphériques



Elever les pieds en position assise,
alimentation à faible teneur en sel.
Eviter de porter des vêtements serrés.



En cas de gonflement des jambes,
élevez les pieds en position assise et
portez des bas de contention.
Si essoufflement, prévenir le médecin
prescripteur pour bilan cardiologique et
respiratoire

*Si vous ressentez des effets non mentionnés, n'hésitez pas à en parler à votre prescripteur, généraliste ou pharmacien.
Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.*

QUELQUES CONSEILS



Contactez rapidement le médecin en cas de :

- difficultés à respirer, toux, essoufflement ou modification du rythme respiratoire.

N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.

Si vous avez oublié de prendre vos comprimés de capmatinib, ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure normale.

Evitez l'**exposition prolongée au soleil** et **protégez-vous** si vous devez le faire.