



# TAGRISSE<sup>®</sup> Osimertinib

PATIENT

## PRESCRIPTION ET DÉLIVRANCE



Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre **médecin hospitalier oncologue ou compétent en oncologie**.  
Il est disponible **dans les pharmacies de ville**.

**Si votre traitement est définitivement interrompu, ne jetez pas les boîtes entamées, ni les comprimés restants dans votre poubelle, mais rapportez-les à votre médecin prescripteur.**

## PRESENTATIONS ET CONSERVATION



Boîtes de 30 comprimés pelliculés dosés à 40 mg ou à 80 mg

Conservez ce médicament à **une température inférieure à 25°C**, à l'abri de la lumière et de l'humidité. **Gardez-le hors de la portée et de la vue des enfants.**

## MODE D'EMPLOI



La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste.  
La dose habituelle est de 80 mg par jour.

**Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.**

Le comprimé de Tagrisso<sup>®</sup> est à avaler avec un verre d'eau **une fois par jour**, pendant ou en dehors du repas.  
Essayez de le prendre chaque jour à la même heure.

Si vous ne pouvez pas avaler le comprimé, vous pouvez le disperser dans un grand verre d'eau un peu tiède. Mélangez jusqu'à ce que le comprimé se soit brisé en très petites particules (environ 5 minutes). Buvez sans attendre.  
Ajoutez un peu d'eau, remuez et buvez de façon à récupérer le maximum de médicament resté au fond du verre.

Votre pharmacien ou médecin peut vous aider.  
Les comprimés ne doivent être ni écrasés, ni coupés ou croqués.

## INTERACTIONS



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes. Par exemple, il faut éviter la prise du **millepertuis** (*Hypericum perforatum*) sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, gouttes,...) qui diminue l'efficacité, de même que l'alcool en prise chronique.

**N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.**

En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

## EFFETS INDESIRABLES



**Eruptions cutanées, acné, démangeaisons**



Préférez un savon doux et un agent hydratant.  
Évitez les expositions prolongées au soleil, utilisez une protection solaire écran total.



Une crème hydratante et un traitement antiprurigineux amélioreront les symptômes : contactez votre médecin traitant

**Inflammation du pourtour de l'ongle**



Évitez de vous ronger les ongles  
Limitez les contacts prolongés avec l'eau  
Mettez des gants pour vos travaux manuels



Bien sécher les pourtours des ongles  
Appliquez une crème hydratante  
Prendre contact avec votre médecin pour prescription adaptée : pommade anti-inflammatoire ou antiseptique selon aspect local

<p><b>Diarrhée</b></p>	<p>⇒ C'est un effet qui arrive souvent : évitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.</p>	<p>⇒ Suivez la prescription médicale contre la diarrhée (Imodium®, Tiorfan®...). Buvez si possible 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes,...), les carottes cuites et les bananes.</p> <p>⇒ Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (plus de 3 diarrhées par jour), en cas de fièvre et si déshydratation : une surveillance biologique du potassium est nécessaire. Le traitement doit être interrompu jusqu'à avis médical</p>
<p><b>Difficulté à respirer, toux, majoration des symptômes pulmonaires</b></p>	<p>⇒ Evitez au maximum le contact avec des personnes ayant une infection contagieuse</p>	<p>⇒ Contactez le médecin si ces signes surviennent pour un examen médical approfondi</p>
<p><b>Fatigue, malaise, symptômes cardiaques</b></p>	<p>⇒ Il est normal d'être fatigué au cours du traitement. Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sainement). Respectez des temps de repos dans la journée, mais essayez de conserver une activité même modérée.</p>	<p>⇒ Soyez à l'écoute de votre corps. Prudence en cas de conduite de véhicules. En cas de fatigue persistante inhabituelle, informez votre médecin : prise de sang et électrocardiogramme peuvent être nécessaires</p>

**Une prise de sang doit être effectuée régulièrement et en cas de symptôme gênant : fièvre, diarrhée importante ou prolongée, essoufflement, malaise**

**Si vous ressentez des effets non mentionnés, n'hésitez pas à en parler à votre prescripteur, généraliste ou pharmacien.**

**Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.**

## QUELQUES CONSEILS



**Contactez rapidement le médecin** en cas de :

- toux ou de difficulté à respirer, fièvre.
- palpitations, malaise

**Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.**

**Si vous avez oublié de prendre vos comprimés de TAGRISSO® depuis plus de 12 heures,** ne prenez pas la dose manquée.

**Si vous avez oublié de prendre votre comprimé depuis moins de 12h,** prenez-le et la dose suivante sera prise à l'heure normale, le lendemain

Evitez l'**exposition prolongée au soleil** et **protégez-vous** si vous devez le faire.

Le traitement est déconseillé pendant la grossesse et l'allaitement, et une contraception efficace est recommandée encore 2 mois après la fin du traitement chez les femmes et 4 mois chez les hommes

*Ce document d'information n'a pas de valeur contractuelle : malgré le soin apporté à la rédaction de ces fiches, une erreur ou une coquille a pu s'y glisser et ne pourra pas être imputée aux auteurs.*