



TAZEMETOSTAT EZH701

PATIENT

PRESCRIPTION ET DÉLIVRANCE



Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre médecin hospitalier spécialiste en oncologie médicale ou en cancérologie.

Il est disponible uniquement dans **les pharmacies hospitalières**, via un programme d'accès précoce.

Ne jetez pas dans votre poubelle les boîtes entamées, ni les comprimés restants. Merci de les rapporter à votre pharmacien.

PRESENTATIONS ET CONSERVATION



Le médicament est disponible sous la forme de flacons de **comprimés** dosés à 200 mg.

Conservez ce médicament à une température inférieure à 25°C. Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants.

MODE D'EMPLOI



La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste. La dose habituelle est de **800 mg deux fois par jour (soit 4 comprimés le matin et le soir) en continu. Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.**

Les comprimés de tazemetostat **sont à avaler entiers**, avec un verre d'eau en **deux prise par jour**, pendant ou en dehors des repas. Essayez de les prendre **chaque jour à la même heure**.

Les comprimés ne doivent être ni écrasés, ni mâchés.

Le **pamplemousse** (jus, pulpe, fruit) doit être évité pendant votre traitement par tazemetostat.

INTERACTIONS



N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre. En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

EFFETS INDESIRABLES



Nausées et vomissements



Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers. Les aliments gras, frits et épicés ne sont pas conseillés. Buvez plutôt entre les repas.



Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements en respectant les doses. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (à partir de deux vomissements par jour).

Perte d'appétit, modification du goût, perte de poids, douleur abdominales



Prenez plusieurs petites collations par jour (aliments que vous aimez), mangez lentement, buvez beaucoup.



Privilégiez les aliments à fort pouvoir calorique : ajouter du beurre, de l'huile, de la crème fraîche, du fromage râpé, du miel...
Demandez les conseils d'une diététicienne. En cas de perte de poids, parlez-en avec votre médecin

Constipation



Buvez régulièrement de l'eau. Pratiquez quelques exercices légers.



Privilégiez une alimentation riche en fibres : légumes verts, fruits et fruits secs. En cas de constipation prolongée par rapport à vos habitudes, contactez votre médecin

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Diarrhée | ⇒ Évitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool. | ⇒ Suivez la prescription médicale contre la diarrhée. Buvez si possible 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes cuites et les bananes. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (plus de 3 selles liquides par jour). |
| Fatigue | ⇒ Il est normal d'être fatigué au cours du traitement. Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sainement). Respectez des temps de repos dans la journée, mais essayez de conserver une activité même modérée. | ⇒ Soyez à l'écoute de votre corps. Prudence en cas de conduite de véhicules. En cas de fatigue persistante inhabituelle, informez votre médecin prescripteur pour adaptation des doses |
| Modification du bilan sanguin | ⇒ Une élévation de la glycémie et des enzymes hépatiques est possible | ⇒ Un bilan sanguin doit être effectué régulièrement et les résultats communiqués à votre médecin |

Si vous ressentez des effets non mentionnés, n'hésitez pas à en parler à votre oncologue, votre médecin généraliste ou votre pharmacien.

QUELQUES CONSEILS



Contactez rapidement le médecin en cas de :

- Éruption cutanée sévère ou atteinte des muqueuses
- Fièvre supérieure à 38°C
- Saignements

N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur. En cas d'oubli d'une prise de moins de 4 heures, prenez la dose.

En cas d'oubli d'une prise de plus de 4 heures, ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle, le lendemain.

En cas de vomissements dans les 30 minutes après la prise du médicament, vous pouvez prendre un anti-émétique et reprendre une nouvelle dose. Au delà de 30 minutes, ne reprenez pas le médicament, reprenez habituellement la dose suivante comme prévu.

Évitez l'exposition prolongée au soleil et **protégez-vous** si vous devez le faire.

Il est contre-indiqué de prendre tazemetostat pendant la **grossesse** et **l'allaitement**.

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.