



TIBSOVO® Ivosidenib

PATIENT

PRESCRIPTION ET DÉLIVRANCE



Ce médicament est prescrit par votre **médecin hospitalier cancérologue**. Il est disponible **à la pharmacie de l'hôpital**.

Si votre traitement est définitivement interrompu, ne jetez pas les boîtes entamées ni les comprimés restants mais rapportez-les à votre pharmacien hospitalier.

PRESENTATIONS ET CONSERVATION



Boîte de 60 comprimés pelliculés à 250 mg.

Conservez ce médicament à une **température inférieure à 25°C**. **Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants.**



MODE D'EMPLOI

La posologie est de 500 mg par jour. L'Ivosidenib est administré par voie orale, **une fois par jour à la même heure chaque jour**.

Bien qu'Ivosidenib peut être pris avec de la nourriture, il ne doit pas être pris avec un repas riche en graisses. Le prendre de **préférence en dehors des repas**.

Les comprimés ne doivent pas être mâchés, croqués ou coupés avant d'être avalés.



INTERACTIONS

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes.

N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.

Le **pamplemousse** (jus, pulpe) doit être évité pendant votre traitement par Ivosidenib.

En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.



EFFETS INDESIRABLES

Fatigue	⇒ Il est normal d'être fatigué au cours du traitement. Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sainement). Respectez des temps de repos dans la journée, mais essayez de conserver une activité même modérée.	⇒ Soyez à l'écoute de votre corps. Prudence en cas de conduite de véhicules. En cas de fatigue persistante inhabituelle, informez votre médecin.
Nausées et vomissements	⇒ Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers. Les aliments gras, frits et épicés ne sont pas conseillés. Buvez plutôt entre les repas.	⇒ Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements en respectant les doses. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (à partir de deux vomissements par jour).
Perte d'appétit	⇒ Prenez plusieurs petites collations par jour (aliments que vous aimez), mangez lentement, buvez beaucoup.	⇒ Privilégiez les aliments à fort pouvoir calorique : ajouter du beurre, de l'huile, de la crème fraîche, du fromage râpé, du miel.... Demandez les conseils d'une diététicienne. En cas de perte de poids, parlez-en avec votre médecin.
Diarrhée	⇒ Si c'est un effet qui arrive souvent. En cas de diarrhée, évitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.	⇒ Suivez la prescription médicale contre la diarrhée. Buvez si possible 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes cuites et les bananes. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (plus de 3 diarrhées par

		jour).	
Eruption cutanée, sécheresse de la peau	⇒	Préférez un produit d'hygiène sans savon (surgras, syndet) et une crème hydratant. Evitez les expositions solaires, utilisez une protection solaire 50+	⇒ Prévenez votre médecin si une éruption cutanée survient, notamment si associée à de la fièvre.
Modification du bilan sanguin	⇒	Un bilan sanguin doit être effectué régulièrement et les résultats communiqués à votre médecin	⇒ Prenez votre température en cas de doute En cas de signes infectieux (fièvre, toux), prévenez votre médecin et faites un bilan sanguin

QUELQUES CONSEILS



Contactez rapidement le médecin en cas de :

- difficultés à respirer, toux, essoufflement ou modification du rythme cardiaque
- signes infectieux (fièvre, toux, frissons ...)
- œdème des membres et douleur thoracique

N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.

Si vous avez oublié de prendre vos comprimés d'Ivosidenib **depuis plus de 12h**, ne prenez pas la dose manquée. Reprendre la dose suivante, à l'heure normale, le lendemain.

En cas de vomissements, ne pas reprendre la dose.

Evitez l'**exposition prolongée au soleil** et **protégez-vous** si vous devez le faire.