Unité de prise en charge des thérapies orales :
03.45.34.81.50
du lundi au vendredi, de 9h à 19h

# TIPIFARNIB

PATIENT

## PRESCRIPTION ET DÉLIVRANCE

Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre **médecin hospitalier cancérologue**. Il est disponible uniquement **dans les pharmacies hospitalières.**

**Si votre traitement est définitivement interrompu, ne jetez pas les boîtes entamées, ni les comprimés restants dans votre poubelle,** mais rapportez-les à votre médecin prescripteur.

## PRESENTATIONS ET CONSERVATION

Boîtes de 45 comprimés dosés à 300 mg.

Conservez ce médicament à **une température inférieure à 25°C,** à l'abri de la lumière et de l'humidité. **Gardez-le hors de la portée et de la vue des enfants.**

## MODE D'EMPLOI

La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste. Elle est habituellement de **900 mg (soit 3 comprimés) matin et soir, une semaine sur 2**.

**Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.**

Les comprimés de tipifarnib sont à avaler avec un verre d'eau **au cours ou en dehors des repas**.
Essayez de respecter un intervalle d'environ 12h entre chaque prise.

## INTERACTIONS

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes. **N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.**

En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

## EFFETS INDESIRABLES

| | | |
|---|---|---|
| ***Diarrhée*** | C'est un effet qui arrive souvent : évitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool, et privilégiez les féculents (riz, pâtes…), les carottes cuites et les bananes | Suivez la prescription médicale contre la diarrhée.<br>Prévenez votre médecin prescripteur dès les premiers signes persistants (plus de 3 diarrhées par jour).<br>Une prise de sang pourra être nécessaire pour vérifier l'ionogramme |
| ***Fatigue*** | Il est normal d'être fatigué au cours du traitement. Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sainement). Respectez des temps de repos dans la journée, mais essayez de conserver une activité même modérée. | Soyez à l'écoute de votre corps.<br>Prudence en cas de conduite de véhicules.<br>En cas de fatigue persistante inhabituelle, informez votre médecin prescripteur pour adaptation des doses |
| ***Nausées et vomissements*** | Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas. | Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements en respectant les doses. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (à partir de deux vomissements par jour). |
| ***Perte d'appétit*** | Prenez plusieurs petites collations par jour (aliments que vous aimez), mangez lentement, buvez beaucoup. | Privilégiez les aliments à fort pouvoir calorique : ajouter du beurre, de l'huile, de la crème fraîche, du fromage râpé, du miel….<br>Demandez les conseils d'une diététicienne.<br>En cas de perte de poids, parlez-en avec votre médecin prescripteur. |



CGFL CENTRE GEORGES FRANÇOIS LECLERC
Ensemble, dépassons le cancer

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Signes d'infection : fièvre, frissons, toux, maux de gorge, brûlures urinaires*** | ⇨ | Limitez, si possible, les contacts rapprochés avec les personnes ayant une infection contagieuse. Lavez-vous souvent les mains. Désinfectez soigneusement toute plaie. Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin. | ⇨ | En cas de fièvre supérieure à 38°C, prévenez votre médecin qui pourra vous prescrire des antibiotiques. |
| ***Modification du bilan sanguin*** | ⇨ | Un bilan sanguin doit être effectué régulièrement et les résultats communiqués à votre médecin. | ⇨ | En cas de saignements inhabituels, prévenir le médecin. Faire pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin. |

***D'autres effets indésirables sont possibles, tels qu'une modification de la couleur des cheveux, un retard à la cicatrisation, une modification du goût, une constipation, une modification de la voix. N'hésitez pas à en parler à votre oncologue.***

## QUELQUES CONSEILS

**Contactez rapidement le médecin** en cas de :

- diarrhées importantes, déshydratation
- hémorragies

**N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.**

**Si vous avez oublié de prendre vos comprimés de tipifarnib**, ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle.

Si vous pensez avoir pris accidentellement plus que la dose prescrite, contactez immédiatement votre médecin.

**En cas de vomissements**, ne prenez pas de dose supplémentaire et ne doublez pas la prise suivante.

*Ce document d'information n'a pas de valeur contractuelle : malgré le soin apporté à la rédaction de ces fiches, une erreur ou une coquille a pu s'y glisser et ne pourra pas être imputée aux auteurs.*



CGFL CENTRE GEORGES FRANÇOIS LECLERC
Ensemble, dépassons le cancer