



VERZENIOS® abemaciclib

PATIENT

PRESCRIPTION ET DÉLIVRANCE



Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre **médecin spécialiste en oncologie ou compétent en cancérologie**. Il est disponible uniquement dans les **pharmacies de ville**.
Ne jetez pas les boîtes entamées, ni les gélules restantes dans votre poubelle. Rapportez-les à votre médecin.
Votre pharmacien peut vous aider dans la prise de votre traitement.

PRESENTATIONS ET CONSERVATION



Trois présentations sont disponibles sous la forme de comprimés pelliculés, en boîte de 14 ou de 56 comprimés :

- dosés à 50 mg (2587,83€ HT) ; de couleur beiges
- dosés à 100 mg (2587,83€ HT) ; de couleur blancs
- dosés à 150 mg (2587,83€ HT) ; de couleurs jaunes

Conservez ce médicament à **température inférieure à 25 °C**

Gardez-le hors de la portée des enfants

MODE D'EMPLOI



La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste.
La dose recommandée est de **150 mg deux fois par jour en continu**.
Les comprimés sont à avaler en entier, avec un grand verre d'eau en deux prises par jour, pendant ou en dehors des repas.

Les comprimés ne doivent être ni ouverts, ni mâchés ou broyés.
Le **pamplemousse** (jus, pulpe) doit être évité pendant votre traitement par abemaciclib.

INTERACTIONS



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments plantes ou tisanes. Par exemple, il faut éviter la prise de **millepertuis** (*Hypericum perforatum*) ou de **pamplemousse** sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, gouttes...).

Prenez l'avis de votre médecin ou pharmacien pour tout médicament, plante ou tisane que vous souhaitez prendre.

EFFETS INDESIRABLES



Diarrhée	⇒ Si c'est un effet qui arrive souvent : évitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool. Prenez les traitements anti-diarrhéiques prescrits <u>dès les premiers signes</u>	⇒ Buvez si possible 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes cuites et les bananes. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (plus de 3 diarrhées par jour).
Modification du bilan sanguin	⇒ Un bilan sanguin doit être effectué régulièrement et les résultats communiqués à votre médecin	⇒ Prenez votre température en cas de doute En cas de signes infectieux (fièvre, toux), prévenez votre médecin et faites un bilan sanguin
Signes d'infection : fièvre, toux, frissons, maux de gorge, brûlures urinaires	⇒ Limitez les contacts rapprochés avec les personnes ayant une infection contagieuse Se laver les mains et désinfecter toute plaie soigneusement Bien respecter le rythme des bilans	⇒ Voir le médecin traitant en cas de fièvre supérieure à 38°C

Nausées et vomissements	 <p>Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers. Les aliments gras, frits et épicés ne sont pas conseillés. Buvez plutôt entre les repas.</p>	 <p>Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements en respectant les doses. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (à partir de deux vomissements par jour).</p>
Fatigue	 <p>La fatigue est normale, mais ne doit pas vous empêcher d'essayer de conserver une activité physique. Se fixer des priorités.</p>	 <p>Prudence en cas de conduite de véhicules. Si fatigue persistante, voir médecin traitant.</p>

Il peut survenir une perte des cheveux, des faiblesses musculaires ou une modification du goût. N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou votre pharmacien.

QUELQUES CONSEILS



Contactez votre médecin rapidement :

- **si essoufflement ou vertiges**
- **si fièvre, frissons, malaise**
- **saignement**
- **œdèmes ou gonflement des jambes**

Si vous avez oublié de prendre vos gélules d'abemaciclib depuis plus de 6h, ne prenez pas la dose manquée. Reprendre la dose suivante, à l'heure normale.

En cas de vomissements, ne pas reprendre la dose.

Ce médicament contient du lactose : en cas d'intolérance (ballonnements, douleurs ou crampes abdominales...), contactez votre médecin.

Ce traitement est déconseillé pendant la grossesse et l'allaitement.

Ce document d'information n'a pas de valeur contractuelle : malgré le soin apporté à la rédaction de ces fiches, une erreur ou une coquille a pu s'y glisser et ne pourra pas être imputée aux auteurs.