



VOTRIENT® pazopanib

PATIENT

PRESCRIPTION ET DÉLIVRANCE



Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre **médecin hospitalier oncologue**. Il est disponible **dans les pharmacies de ville**. Lorsque vous quittez votre domicile, pensez à prendre vos ordonnances et faites activer votre dossier pharmaceutique. **Si votre traitement est définitivement interrompu, ne jetez pas les boîtes entamées ni les comprimés restants** mais rapportez-les à votre médecin prescripteur

PRESENTATIONS ET CONSERVATION



VOTRIENT® se présente sous 2 dosages :

- Comprimé 200 mg pelliculé, rose, en forme de gélule, boîte de 30 (748,61 €).
- Comprimé 400 mg pelliculé, blanc, en forme de gélule, boîte de 30 (1459,89 €).

Conservez ce médicament à **une température inférieure à 25°C**.
Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants.

MODE D'EMPLOI



La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste. **La dose initiale** est de **800 mg une fois par jour**.

Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.

Les comprimés VOTRIENT® sont à avaler entiers avec **un verre d'eau en une prise par jour** en dehors des repas, c'est-à-dire 1 heure avant ou 2 heures après. **Essayez de les prendre chaque jour à la même heure.**

Les comprimés ne doivent ni être écrasés, ni coupés ou croqués.

INTERACTIONS



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes.

N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.

Le **pamplemousse** (jus, pulpe) doit être évité pendant votre traitement par VOTRIENT® ; car il augmente les toxicités du traitement.

Évitez les médicaments utilisés pour traiter les brûlures d'estomac. En cas de besoin, ces médicaments doivent être pris à distance du VOTRIENT®.

En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

EFFETS INDESIRABLES



Diarrhée



Évitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.



Suivez la prescription médicale contre la diarrhée. Buvez si possible 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes cuites et les bananes. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (plus de 3 diarrhées par jour).

Nausées et vomissements



Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers. Les aliments gras, frits et épicés ne sont pas conseillés. Buvez plutôt entre les repas.



Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements en respectant les doses. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (à partir de deux vomissements par jour).

Perte d'appétit	⇒ Prenez plusieurs petites collations par jour (aliments que vous aimez), mangez lentement, buvez beaucoup.	⇒ Privilégiez les aliments à fort pouvoir calorique : ajouter du beurre, de l'huile, de la crème fraîche, du fromage râpé, du miel... Demandez les conseils d'une diététicienne. En cas de perte de poids, parlez-en avec votre médecin.
Fatigue	⇒ Il est normal d'être fatigué au cours du traitement. Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sainement). Respectez des temps de repos dans la journée, mais essayez de conserver une activité même modérée.	⇒ Soyez à l'écoute de votre corps. Prudence en cas de conduite de véhicules. En cas de fatigue persistante inhabituelle, informez votre médecin.
Eruptions et sécheresse cutanées	⇒ Préférez un savon doux sans alcool et une crème hydratante. Evitez les expositions prolongées au soleil.	⇒ Informez votre médecin, des traitements médicaux peuvent vous soulager.
Apthes Altération du goût	⇒ Evitez les aliments acides, épicés et irritants. Utilisez une brosse à dents souple, un dentifrice doux (sans menthol) et un bain de bouche sans alcool.	⇒ Demandez conseil à votre pharmacien En cas d'apparition de douleurs diffuses dans la bouche ou de brûlure : contactez votre médecin.
Modification du bilan sanguin	⇒ Un bilan sanguin doit être effectué régulièrement et les résultats communiqués à votre médecin.	⇒ En cas de signes infectieux (fièvre, toux) ou de saignements inhabituels, prévenir le médecin. Faire pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.

Si vous ressentez des effets non mentionnés, n'hésitez pas à en parler à votre prescripteur ou à votre généraliste. Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Une perte de cheveux peut survenir pendant le traitement, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin.

QUELQUES CONSEILS



Contactez rapidement le médecin en cas de :

- Modification du rythme cardiaque
- Saignements au niveau du système digestif
- Signes infectieux (fièvres, toux, frissons...)

N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.

Si vous avez oublié de prendre vos comprimés de VOTRIENT®, ou en cas de vomissements, ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure normale.

Evitez l'**exposition prolongée au soleil** et **protégez-vous** si vous devez le faire.