



XTANDI® Enzalutamide

PATIENT

PRESCRIPTION ET DÉLIVRANCE



Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre **médecin hospitalier oncologue**. Il est disponible **dans les pharmacies de ville**. Lorsque vous quittez votre domicile, pensez à prendre vos ordonnances et faites activer votre dossier pharmaceutique. **Si votre traitement est définitivement interrompu, ne jetez pas les boîtes entamées, ni les comprimés restants, mais rapportez-les à votre médecin prescripteur.**

PRESENTATIONS ET CONSERVATION



Boîte de 112 comprimés de 40 mg (2960.33 €).
Conservez ce médicament dans son emballage d'origine à **une température inférieure à 25°C**, à l'abri de la lumière et de l'humidité.
Gardez-le hors de la portée et de la vue des enfants.

MODE D'EMPLOI



La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste. La dose recommandée est de **160 mg soit 4 comprimés de 40 mg par jour**.

Les comprimés d'XTANDI® sont à avaler **entiers** avec un verre d'eau, au cours ou en dehors des repas, **en une prise par jour**. Essayez de **les prendre chaque jour à la même heure**.

Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.

INTERACTIONS



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes.

Une surveillance de votre fonction cardiaque par un ECG pourra être faite régulièrement.
Attention avec les médicaments comme la coumadine, une surveillance complémentaire sera nécessaire. En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.

En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

EFFETS INDESIRABLES



Signes d'infection : fièvre, frissons, toux, maux de gorge, brûlures urinaires	⇒	Limitez, si possible, les contacts avec les personnes ayant une infection contagieuse. Lavez-vous souvent les mains. Désinfectez soigneusement toute plaie. Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.	⇒	En cas de fièvre supérieure à 38°C, prévenez votre médecin.
Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhée, anorexie	⇒	Fractionnez vos repas. Adaptez vos aliments. Mangez lentement.	⇒	Prenez les traitements prescrits en fonction des symptômes. En cas de signes persistants (plus de 2 jours) ou importants (plus de 2 vomissements et plus de 3 diarrhées), prévenir votre médecin.
Maux de tête, palpitations, bourdonnements d'oreille	⇒	Mesurez régulièrement votre tension. Surveillez régulièrement votre cœur. Faites de l'exercice, contrôlez votre poids. Limitez la consommation de sel et d'alcool.	⇒	Contactez votre médecin si ces signes surviennent. Un traitement par antihypertenseur vous sera prescrit si besoin.

Troubles de la mémoire et de la concentration, insomnies, anxiété et hallucinations visuelles	⇒		⇒	En cas de symptômes persistants ou gênant, informez votre médecin traitant. Prudence en cas de conduite de véhicules et d'utilisation de machines.
Sécheresse cutanée, démangeaisons, picotements	⇒	Préférez un savon doux sans alcool et appliquez de la crème hydratante en prévention. Évitez les expositions au soleil. Utilisez une protection solaire type : écran total.	⇒	En cas de symptômes persistants ou gênants, informez votre médecin traitant. Prudence en cas de conduite de véhicules et d'utilisation de machines.
Bouffées de chaleur	⇒	Évitez les facteurs déclenchants comme l'alcool, la caféine, le tabac, les aliments chauds et épicés.	⇒	Bien s'hydrater. Restez au frais. En cas de symptômes persistant, consultez votre médecin traitant.

QUELQUES CONSEILS



Contactez rapidement le médecin en cas de :

- Convulsions, confusion, troubles de la vue.
- Troubles au niveau du cœur (modification du rythme cardiaque, douleur, essoufflement...), œdème des membres et douleur thoracique
- Maux de tête inhabituels, sensations de vertiges et de bourdonnements d'oreille

N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.

Si vous avez oublié de prendre vos comprimés d'XTANDI® depuis plus de 12h, ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure normale, le lendemain.

Évitez l'**exposition prolongée au soleil** et **protégez-vous** si vous devez le faire.