



PRESCRIPTION ET DÉLIVRANCE



Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre **médecin hospitalier oncologue**. Il est disponible **dans les pharmacies de ville**. Lorsque vous quittez votre domicile, pensez à prendre vos ordonnances et faites activer votre dossier pharmaceutique. **Si votre traitement est définitivement interrompu, ne jetez pas les boîtes entamées ni les comprimés restants** mais rapportez-les à votre médecin prescripteur.

PRESENTATIONS ET CONSERVATION



Une présentation est disponible par boîtes de 60 comprimés dosés à 500 mg (3071,39 €).
Conservez ce médicament à **une température ambiante inférieure à 30°C**. **Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants**

MODE D'EMPLOI



La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste. **La dose habituelle est de 1000 mg** en une seule prise par jour, en association avec prednisone ou prednisolone (dose recommandée : 10 mg par jour).

Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.

Les comprimés de ZYTIGA[®] sont à avaler **entiers avec un verre d'eau en dehors des repas**.
Prenez votre médicament **au moins deux heures après le repas** et ne mangez rien pendant **au moins une heure après la prise de ZYTIGA[®]**.

Les comprimés ne doivent ni être écrasés, ni coupés ou croqués.

INTERACTIONS



Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes. Il faut éviter la prise du **millepertuis** (*Hypericum perforatum*) sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, gouttes...), qui diminue l'efficacité du traitement.

N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.

En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

EFFETS INDESIRABLES



Œdème des membres	➡	Elevez vos pieds quand vous êtes assis. Maintenez une alimentation à faible teneur en sel. Evitez les vêtements serrés.	➡	Surveillez régulièrement votre poids. Si prise de poids rapide et inattendue, contactez le médecin.
Brûlure urinaire ou urine trouble	➡	Buvez, si possible, beaucoup d'eau (quantité recommandée : 1.5 litre)	➡	Surveillez votre température. En cas de signes infectieux (fièvre, frissons, douleurs), contactez votre médecin.
Hypertension	➡	En cas de maux de tête, palpitations, bourdonnement d'oreille Vérifiez ou faites vérifier régulièrement la tension artérielle. Faites de l'exercice, contrôlez votre poids. Limiter la consommation de sel et d'alcool.	➡	Contactez votre médecin si ces signes surviennent ou s'amplifient. Un traitement par anti-hypertenseur vous sera prescrit si besoin.

Si vous ressentez des effets non mentionnés, n'hésitez pas à en parler à votre prescripteur ou à votre généraliste. Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

QUELQUES CONSEILS



Contactez rapidement le médecin en cas de :

- faiblesse musculaire, contractions musculaires
- forts battements du cœur (palpitations), douleur thoracique

- essoufflements
- prise de poids

N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.

Si vous avez oublié de prendre vos comprimés de ZYTIGA® depuis plus de 8h, ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle le lendemain.

Si vous oubliez de prendre le ZYTIGA® pendant plus d'un jour, prévenez votre médecin sans délai.